



<b>Lasix:</b> <b>利尿劑。</b> 此藥有助於清除多餘的尿液。尿液過多 是手術後常見的現象。  每次 _____ 毫克，每日 _____ 次	上午 8 時																		
	下午 2 時																		
	晚上 8 時																		
<b>Aldactone:</b> <b>利尿劑。</b> 此藥有助於清除多餘的尿液。尿液過多 是手術後常見的現象。  每次 _____ 毫克，每日 _____ 次	上午 8 時																		
	下午 2 時																		
	晚上 8 時																		
<b>Protonix/Nexium:</b> <b>制酸劑。</b> 此藥有助於防止胃潰瘍。  每次 _____ 毫克，每日 _____ 次	上午 8 時																		
	下午 5 時																		
<b>Cardizem CD</b> <b>血壓藥</b> 此藥有助於提高新山地明的水準。  每日 _____ 毫克	上午 8 時																		
<b>Percocet 5/325 毫克片劑</b> <b>止痛藥</b>  每隔 ____ 小時服用 ____ 片 按止痛需要而定。																			
每次 _____ 毫克，每日 _____ 次																			
每次 _____ 毫克，每日 _____ 次																			
每次 _____ 毫克，每日 _____ 次																			

每次 _____ 毫克，每日 _____ 次																			