Prednisone（強的松）（**Deltasone®、Orasone®、Prednicen-M®、Liquid Pred®**）

藥物名稱： Deltasone®、Orasone®、Prednicen-M®、Liquid Pred®

學名： Prednisone（強的松）

用途： Prednisone（強的松）是一種用於減輕身體各部位發炎（腫脹）的類固醇。還可用於治療因化療造成的噁心和嘔吐，以及增強有嚴重食慾問題的癌症病人的食慾。Prednisone（強的松）類似於腎上腺（位於腎臟頂部的腺體）產生的激素。

形式： 藥丸

用法：

- 按照醫師的指示服用 Prednisone（強的松）。醫師將確定劑量和服藥時間表。
- Prednisone（強的松）應配以食物或牛奶服用。
- 請勿在服用 Prednisone（強的松）期間飲酒。
- 按照處方服用 Prednisone（強的松）。若您漏服一劑藥物，請致電醫師以尋求指示。
- 請勿突然暫停服用 Prednisone（強的松），除非醫師告訴您這樣做。
- 告訴所有醫療保健提供者您將服用或最近服用過 Prednisone（強的松）。若您正在接受嚴重感染治療或在做手術，這*非常重要*。
    - Prednisone（強的松）會抑制（放緩）免疫系統。這意味著身體很難抵抗感染。
    - Prednisone（強的松）令您很難從手術中痊癒。身體痊癒需要比平常更長的時間。
- 服用 Prednisone（強的松）期間，醫師將對您進行密切跟進。告訴醫師您出現的任何症狀或副作用。

可能的副作用：

- 白細胞數量、血糖和血壓增加。您的醫師將定期檢查這些值。
- 食欲增強
- 水腫（浮腫）
- 手腳腫脹
- 體重增加
- 增加感染的危險
- 胃部不適
- 出血性潰瘍。您會出現腹部（肚子）疼痛、嘔吐和便血。
- 睡眠不好
- 過動症（異常活躍、無法保持安靜或靜止）
- 煩躁情緒加劇、情緒變化、精神病（無判斷力、幻覺、與現實脫節）
- 大便呈黑色焦油狀（請立即致電醫師）

長時間服用 Prednisone（強的松）會造成：

- 鬍子增多
- 負重骨骼，即支撐體重（腿部和臀部）的骨骼，發生骨折
- 青光眼（可造成視力缺失和失明的眼部疾病）
- 血凝塊高風險
- 面部腫脹

重要注意事項： 若您出現上述症狀，請**立即**致電醫師。這些副作用是可以治療的，不必驚慌。