



## Prednisone (Deltasone®, Orasone®, Prednicen-M®, Liquid Pred®)

Nombre del medicamento: Deltasone®, Orasone®, Prednicen-M®, Liquid Pred®

Nombre genérico: prednisona

**Objetivo:** Prednisone es un esteroide que se usa para reducir la inflamación (hinchazón) de distintas partes del cuerpo. Puede usarse para tratar las náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia y para aumentar el apetito en pacientes oncológicos con problemas graves de pérdida de apetito. Prednisone es similar a una hormona que producen las glándulas suprarrenales (ubicadas arriba de los riñones).

**Forma:** Píldora

**Cómo tomarlo:**

- Tome prednisone según la indicación de su médico. Su médico determinará la dosis y el horario.
- Siempre tome Prednisone **CON COMIDA** o **LECHE**.
- **NO** consuma alcohol mientras realiza tratamiento con prednisone.
- Tome prednisone exactamente en la forma recetada. Si se olvida de tomar una dosis, comuníquese con su médico para recibir instrucciones.
- **NO** interrumpa repentinamente el tratamiento con prednisone salvo que su médico se lo indique.
- Informe a todos sus proveedores de cuidados de salud que usted está tomando prednisone o recientemente ha tomado ese medicamento. Esto es *fundamental* si usted recibe tratamiento por una infección grave o se somete a una cirugía.
  - Prednisone inhibirá (disminuirá) su sistema inmunológico. Esto significa que le será muy difícil para su organismo combatir las infecciones.
  - Prednisone dificultará el proceso de cicatrización después de una cirugía. Tardará más tiempo que lo común en cicatrizar.
- Su médico lo controlará muy atentamente mientras usted esté tomando prednisone. Informe a su médico sobre cualquier síntoma o efecto secundario que tenga.



Efectos secundarios posibles:

- Mayor recuento de glóbulos blancos, aumento del azúcar en sangre y aumento de la presión arterial. Su médico realizará análisis periódicos para controlar los niveles.
- Aumento del apetito
- Retención de líquidos (sensación de hinchazón)
- Hinchazón de manos y pies
- Aumento de peso
- Aumento del riesgo de infección
- Irritación estomacal
- Úlcera hemorrágica. Tendrá dolor abdominal (vientre), vómitos y sangre en las evacuaciones.
- Problemas para dormir
- Hiperactividad (mayor actividad que la habitual, imposibilidad de permanecer quieto o calmado)
- Mayor irritabilidad, cambios de humor, psicosis (desorientación, alucinaciones, pérdida del sentido de la realidad)
- Evacuaciones intestinales negras, semejantes al alquitrán (llame al médico inmediatamente)

El tratamiento prolongado con prednisone puede provocar:

- Aumento del vello facial
- Fractura de los huesos que soportan el peso del cuerpo (piernas y caderas)
- Glaucoma (enfermedad que causa disminución de la vista o ceguera)
- Mayor riesgo de formación de coágulos
- Hinchazón de la cara

**Importante:** Llame a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los síntomas descritos arriba. Estos efectos secundarios pueden tratarse y no deben alarmarlo.