



Prochlorperazine (Compazine®)

Nombre del medicamento: Compazine®

Nombre genérico: proclorperacina

Objetivo: Compazine se utiliza para aliviar las náuseas y/o vómitos provocados por la quimioterapia

Forma:

- Píldora
- Vía intravenosa (IV)
- Supositorio rectal
- Inyección

Cómo tomarlo:

- Compazine puede administrarse por vía oral (por boca) en forma de píldora
- Compazine puede administrarse por vía rectal (en el recto o ano) como supositorio
- Compazine puede administrarse por vía intravenosa (en la vena)
- Compazine puede administrarse en inyección por vía intramuscular (en el músculo)

Efectos secundarios posibles:

- Somnolencia
- Boca seca
- Estreñimiento
- Trastornos del sistema extrapiramidal (transitorios)
 - Sensación de opresión en la cara o cuello
 - Engrosamiento de la lengua
 - Dificultad al hablar
 - Boca caída
 - Chasquido de labios
 - Espasmos musculares
 - Movimientos repentinos de cabeza, lengua, mandíbula, brazos o piernas

Importante: Llame a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los síntomas del sistema extrapiramidal descritos arriba. Estos efectos secundarios pueden tratarse y no deben alarmarlo.