



Capecitabine (Xeloda®) (Капецитабин (Кселода®))

Непатентованное наименование препарата: capecitabine (капецитабин)

Наименование препарата: Xeloda® (Кселода®)

Показания: Xeloda (Кселода) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения определенных видов рака, включая метастазирующий рак молочной железы (рак молочной железы, при котором раковые клетки распространяются в другие части тела), некоторые стадии рака толстой кишки, а также метастазирующий колоректальный рак (рак толстой или прямой кишки, при котором раковые клетки распространяются в другие части тела).

Форма выпуска: таблетки:

- 150 мг (светло-персикового цвета)
- 500 мг (персикового цвета)

Применение:

- Препарат Xeloda (Кселода) следует принимать по назначению врача. Ваш врач подберет необходимую комбинацию таблеток для утреннего и вечернего приема.
- Перед приемом препарата убедитесь в том, что вы используете нужные таблетки (проверьте цвет).
- Препарат Xeloda (Кселода) следует принимать в течение 30 минут ПОСЛЕ еды.
- Запивайте таблетки Xeloda (Кселода) стаканом (8 унций) воды.
- Если вы не приняли очередную дозу препарата, просто пропустите ее и позвоните своему врачу. НЕ СЛЕДУЕТ принимать пропущенную дозу позже в течение дня. НЕ СЛЕДУЕТ удваивать следующую дозу.
- Сообщите врачу, если вы принимаете фолиевую кислоту. Фолиевая кислота может нарушить воздействие препарата Xeloda (Кселода) на ваш организм.
- Стандартный курс приема препарата Xeloda (Кселода) составляет 14 дней; затем следует 7-дневный перерыв, позволяющий отдохнуть вашему организму.
- Сообщайте врачу о появлении любых побочных эффектов.
- В зависимости от побочных эффектов ваш врач может изменить дозу принимаемого препарата или продолжительность его приема.



Возможные побочные эффекты:

- умеренно выраженная диарея (учащение стула до 4 раз в день);
- тошнота и/или рвота;
- язвы в ротовой полости;
- спазмы и/или запор;
- снижение аппетита;
- покалывание, онемение, боль, отек или покраснение ладоней или подошв;
- сыпь, сухость кожи и/или кожный зуд;
- утомляемость (чувство усталости);
- слабость;
- головокружение;
- головная боль;
- жар.

Важно!

Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:

- умеренная или выраженная диарея (учащение стула до более чем 4 раз в день);
- умеренная боль, покраснение, отек или язвы в ротовой полости;
- покалывание, онемение, боль, отек или покраснение ладоней или подошв;
- рвота.