



## Capecitabine (Xeloda®)

Nombre genérico: capecitabine

Nombre del medicamento: Xeloda®

**Objetivo:** Xeloda es un agente quimioterapéutico que se utiliza en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, entre otros, la metástasis de cáncer de seno (cáncer de seno que se ha diseminado a otras partes del cuerpo), ciertos estadios de cáncer de colon y cáncer colorrectal metastásico (cáncer de colon o recto diseminado a otras partes del cuerpo).

**Forma:** Píldora

- 150 mg (color durazno claro)
- 500 mg (color durazno)

**Cómo tomarlo:**

- Tome Xeloda según la indicación de su médico. Su médico determinará la combinación de píldoras para su dosis de la mañana y de la noche
- Asegúrese de estar tomando las píldoras correctas (verifique el color) antes de tomarlas
- Tome Xeloda durante los 30 minutos siguientes, **DESPUÉS** de comer
- Beba 8 onzas de agua cada vez que toma Xeloda
- Si se olvida de tomar una dosis, saltéela y llame a su médico. **NO** la tome más tarde durante el día. **NO** tome una dosis doble.
- Informe a su médico si está tomando ácido fólico. El ácido fólico puede afectar la forma en que Xeloda actúa sobre su organismo.
- Xeloda, por lo general, se toma durante 14 días, seguidos de un descanso de 7 días para que el organismo se reponga.
- Informe a su médico sobre cualquier efecto secundario que tenga.
- Su médico puede modificar la dosis que toma o la cantidad de días de tratamiento sobre la base de los efectos secundarios que experimente.

**Efectos secundarios posibles:**

- Diarrea leve (menos de 4 evacuaciones flojas diarias)
- Náuseas y/o vómitos
- Llagas en la boca
- Calambres y/o estreñimiento
- Pérdida de apetito



- Sensación de hormigueo, entumecimiento, dolor, hinchazón o enrojecimiento de manos o palma de pies
- Sarpullido, piel seca y/o picazón
- Fatiga (sensación de cansancio)
- Debilidad
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Fiebre

Importante: Llame a su médico **inmediatamente** si tiene:

- Diarrea moderada o severa (más de 4 evacuaciones flojas diarias)
- Dolor o enrojecimiento moderado de la boca, hinchazón de la boca o llagas
- Sensación de hormigueo, entumecimiento, dolor, hinchazón o enrojecimiento de manos o palma de pies
- Vómitos