



## Prednisone ( 強的松 ) ( Deltasone®、Orasone®、Prednicen-M®、Liquid Pred® )

學名： Prednisone ( 強的松 )

藥物名稱： Deltasone®、Orasone®、Prednicen-M®、Liquid Pred®

用途： Prednisone ( 強的松 ) 是一種用於減輕身體各部位發炎 ( 腫脹 ) 的類固醇。還可用於治療因化療造成的噁心和嘔吐，以及增強有嚴重食慾問題的癌症病人的食慾。Prednisone ( 強的松 ) 類似於腎上腺 ( 位於腎臟頂部的腺體 ) 產生的激素。

形式： 藥丸

用法：

- 按照醫師的指示服用 Prednisone ( 強的松 )。醫師將確定劑量和服藥時間表。
- Prednisone ( 強的松 ) 應配以食物或牛奶服用。
- 請勿在服用 Prednisone ( 強的松 ) 期間飲酒。
- 按照處方服用 Prednisone ( 強的松 )。若您漏服一劑藥物，請致電醫師以尋求指示。
- 請勿突然暫停服用 Prednisone ( 強的松 )，除非醫師告訴您這樣做。
- 告訴所有醫療保健提供者您將服用或最近服用過 Prednisone ( 強的松 )。若您正在接受嚴重感染治療或在做手術，這**非常重要**。
  - Prednisone ( 強的松 ) 會抑制 ( 放緩 ) 免疫系統。這意味著身體很難抵抗感染。
  - Prednisone ( 強的松 ) 令您很難從手術中痊癒。身體痊癒需要比平常更長的時間。
- 服用 Prednisone ( 強的松 ) 期間，醫師將對您進行密切跟進。告訴醫師您出現的任何症狀或副作用。



可能的副作用：

- 白細胞數量、血糖和血壓增加。您的醫師將定期檢查這些值。
- 食欲增強
- 水腫 ( 浮腫 )
- 手腳腫脹
- 體重增加
- 增加感染的危險
- 胃部不適
- 出血性潰瘍。您會出現腹部 ( 肚子 ) 疼痛、嘔吐和便血。
- 睡眠不好
- 過動症 ( 異常活躍、無法保持安靜或靜止 )
- 煩躁情緒加劇、情緒變化、精神病 ( 無判斷力、幻覺、與現實脫節 )
- 大便呈黑色焦油狀 ( 請立即致電醫師 )

長時間服用 Prednisone ( 強的松 ) 會造成：

- 鬍子增多
- 負重骨骼，即支撐體重 ( 腿部和臀部 ) 的骨骼，發生骨折
- 青光眼 ( 可造成視力缺失和失明的眼部疾病 )
- 血凝塊高風險
- 面部腫脹

**重要注意事項：** 若您出現上述症狀，請**立即**致電醫師。這些副作用是可以治療的，不必驚慌。