



Bleomycin (Блеомицин)(Blenoxane[®])

Наименование препарата: Blenoxane[®]

Международное непатентованное наименование препарата: Bleomycin (Блеомицин)

Показания: Bleomycin (Блеомицин) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения ряда онкологических заболеваний. Также используется для лечения и предотвращения скопления жидкости вокруг легких при некоторых видах рака. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли.

Способы применения:

- Внутривенное введение квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).
- Внутримышечное или подкожное введение (инъекция) квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).
- Внутривезикулярное введение (в легкие) при помощи плевральной дренажной трубки при лечении злокачественного плеврального выпота (скопления жидкости вокруг легких), а также для предотвращения рецидивов плеврального выпота. Лечение проводится врачом в условиях стационара.

Возможные побочные эффекты:

- Через несколько часов после введения препарата может начаться лихорадка с ознобом и продолжаться в течение нескольких часов. Посоветуйтесь с врачом или медсестрой о том, что необходимо предпринять в таком случае.
- В процессе введения препарата или через несколько часов может понизиться артериальное давление. Сообщите врачу или медсестре, если у вас появились следующие симптомы:
 - головокружение;
 - слабость.
- В течение 2-10 дней после введения препарата могут появиться язвы в ротовой полости. С любым дискомфортом вам помогут справиться медицинские препараты. Если в ротовой полости появились язвы:
 - не используйте спиртосодержащие средства, в том числе ополаскиватель для полости рта;
 - используйте мягкую зубную щетку;
 - не употребляйте алкоголь;



- воздержитесь от употребления острых и кислотных продуктов питания.
- Кожные реакции:
 - темные полосы на ногтях или на ладонях;
 - сыпь;
 - зуд.
- Умеренная тошнота и рвота.
- Потеря аппетита или изменение вкусовых ощущений.

- Введение препарата Bleomycin (Блеомицин) внутривенно или посредством инъекции может вызвать рубцевание легочной ткани. Сообщите врачу или медсестре перед следующим введением препарата, если у вас:
 - отрывистый сухой кашель;
 - одышка или затрудненное дыхание;
 - боль в груди.
- При введении препарата Bleomycin (Блеомицин) посредством плевральной трубки возможны жар, боль в груди в месте введения трубки или боль при глубоком вдохе. В большинстве случаев ваш врач выпишет вам обезболивающие препараты. Пожалуйста, сообщайте обо всех симптомах вашей медсестре или врачу.

Важно!

При приеме препарата Bleomycin (Блеомицин) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (о методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.