



## Dacarbazine (DTIC®)

Nombre del medicamento: DTIC®

Nombre genérico: dacarbazine

Objetivo: Dacarbazine es un medicamento para quimioterapia que se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer. Este medicamento interfiere con la reproducción y crecimiento celular y de este modo impide que el cáncer progrese o se propague.

Cómo se administra la droga:

- Inyectada por vía intravenosa (IV) en una vena por una enfermera calificada en el hospital o centro de cáncer.

Efectos secundarios posibles:

- Náuseas y vómitos moderados. Hay medicamentos disponibles para ayudar a prevenir o controlar las náuseas.
- Dígale a su médico o enfermera si tiene:
  - dolor o ardor en el sitio de infusión
  - rubor (enrojecimiento) u hormigueo en la cara
  - sarpullido rojo o con picazón
- Síntomas tipo gripe hasta 7 días después del tratamiento. Dígale a su médico si:
  - tiene dolores en el cuerpo
  - tiene fiebre de 100.4°F o más
  - se siente muy cansado
- Disminución del recuento de glóbulos blancos. Llame a su médico si tiene:
  - fiebre
  - tos de reciente aparición
- Disminución del recuento de glóbulos rojos. Llame a su médico si tiene:
  - mareos
  - falta de aire
  - cansancio excesivo
- Disminución del recuento de plaquetas. Llame a su médico si tiene:
  - sangrado
  - nuevos hematomas
  - pequeños puntos rojos en la piel
- Pérdida temporal del cabello que comienza aproximadamente 2 semanas después del primer tratamiento. Su cabello volverá a crecer.
- Su piel tendrá más sensibilidad al sol y tendrá más probabilidades de sufrir quemaduras. Evite la exposición directa a la luz solar y NO utilice camas solares. Use bloqueador solar con factor de protección solar



(SPF) de por lo menos 30. Utilice ropa que lo proteja del sol, por ejemplo pantalones largos, mangas largas, sombrero y anteojos de sol.

**Importante:**

Converse con su médico sobre métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras este bajo el tratamiento con dacarbazine.