



Cyclophosphamide (Циклофосфамид) (Cytoxan[®], Neosar[®])

Наименование препарата: Cytoxan[®], Neosar[®]

Международное непатентованное наименование препарата: Cyclophosphamide (Циклофосфамид)

Показания: Cyclophosphamide (Циклофосфамид) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения ряда онкологических заболеваний. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли.

Способы применения:

- Cyclophosphamide (Циклофосфамид) можно принимать перорально (через рот) в форме таблеток по утрам. Если к таблеткам прикасается кто-либо, кроме вас, он должен использовать одноразовые перчатки. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проглатывайте таблетку целиком. **НЕ РАЗЛАМЫВАЙТЕ И НЕ ИЗМЕЛЬЧАЙТЕ ТАБЛЕТКУ!**
- Препарат Cyclophosphamide (Циклофосфамид) вводится внутривенно квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).

Возможные побочные эффекты:

- Умеренная тошнота и рвота.
- Потеря аппетита.
- Раздражение мочевого пузыря, возможно кровотечение.
 - Сообщите врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - розово-красный цвет мочи;
 - боль при мочеиспускании;
 - затрудненное мочеиспускание.
 - Для предотвращения раздражения мочевого пузыря **НЕОБХОДИМО**:
 - Ежедневно выпивать 8-10 стаканов (8 унций) безалкогольных, не содержащих кофеина жидкостей. Проконсультируйтесь с врачом или медсестрой о том, какое именно количество жидкости вам следует потреблять.
 - Чаще мочиться, особенно перед отходом ко сну.
- Снижение уровня лейкоцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - жар;
 - кашель.



- Снижение уровня эритроцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - головокружение;
 - одышка;
 - чрезмерная утомляемость.
- Низкое содержание тромбоцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - кровотечение;
 - синяки;
 - точечная красная сыпь на коже.
- Временное выпадение волос приблизительно через 2 недели после первого введения препарата. Это явление временное и обратимое.

Важно!

1. Cyclophosphamide (Циклофосфамид) может взаимодействовать с другими препаратами, например препаратами, разжижающими кровь, такими как Digoxin (Lanoxin) (Дигоксин (Ланоксин)). Сообщите врачу, если вы принимаете данные препараты.
2. Cyclophosphamide (Циклофосфамид) может приводить к нарушению репродуктивной функции (как у мужчин, так и у женщин), вызывая бесплодие, которое может быть необратимым. При приеме препарата Cyclophosphamide (Циклофосфамид) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (о методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.
3. Если к таблеткам прикасается кто-либо, кроме вас, он **ДОЛЖЕН** использовать одноразовые перчатки.
4. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проглатывайте таблетку целиком. **НЕ РАЗЛАМЫВАЙТЕ И НЕ ИЗМЕЛЬЧАЙТЕ ТАБЛЕТКУ!**