



Cisplatin (Platinol®)

Nombre genérico: cisplatin

Nombre del medicamento: *Platinol*®

Objetivo: Cisplatin es un medicamento para quimioterapia que se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer. Este medicamento interfiere con la reproducción y crecimiento celular y de este modo impide que el cáncer progrese o se propague.

Cómo se administra la droga:

- Inyectada por vía intravenosa (IV) en una vena por una enfermera calificada en el hospital o centro de cáncer.
- Por vía intraperitoneal (IP) en la cavidad abdominal por una enfermera calificada en el hospital o centro de cáncer.

Efectos secundarios posibles:

- Náuseas y vómitos. Hay medicamentos disponibles para ayudar a prevenir o controlar las náuseas.
 - comienzan de 4 a 12 horas después del tratamiento
 - pueden durar de 2 a 4 días
- Estreñimiento.
- Problemas en los riñones.
 - para prevenir problemas en los riñones, usted DEBE beber por lo menos entre 8 y 10 vasos (8 onzas) de bebidas no alcohólicas o descafeinadas todos los días. Por favor, pregúntele a su médico o enfermera cuánto debe beber exactamente.
 - le harán análisis de sangre regularmente para controlar su función renal
- Disminución del recuento de glóbulos blancos. Llame a su médico si tiene:
 - fiebre
 - tos de reciente aparición
- Disminución del recuento de glóbulos rojos. Llame a su médico si tiene:
 - mareos
 - falta de aire
 - cansancio excesivo
- Disminución del recuento de plaquetas. Llame a su médico si tiene:
 - sangrado
 - nuevos hematomas
 - pequeños puntos rojos en la piel
- Pérdida de apetito o cambio en el sabor de los alimentos.
- Problemas de audición. Llame a su médico si tiene:



- dificultad para escuchar, especialmente los sonidos de tonos altos
- zumbido o murmullo en los oídos
- Hormigueo en los dedos de las manos o de los pies. Dígale a su médico si siente alguno de estos síntomas.
- Pérdida temporal del cabello que comienza aproximadamente 2 semanas después del primer tratamiento. Su cabello volverá a crecer.

Importante:

Converse con su médico sobre métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras esté bajo el tratamiento con cisplatino.