



## Cisplatin (Platinol®)

學名:cisplatin ( 順鉑 )

藥品名:Platinol®

用途: Cisplatin ( 順鉑 ) 是一種化療藥物，可用來治療特定類型的癌症，這種藥物透過干擾細胞繁殖和生長，防止癌細胞生長或擴散。

給藥方式:

- 由醫院或癌症治療中心受過專門訓練的護士透過靜脈(IV)給藥。
- 由醫院或癌症治療中心受過專門訓練的護士透過腹腔(IP)給藥。

可能的副作用:

- 噁心和嘔吐。可用藥物預防或控制嘔吐。
  - 治療後 4 至 12 個小時開始出現
  - 可能會持續 2 至 4 天
- 便秘
- 腎臟疾病
  - 每天至少要喝 8 至 10 杯 ( 8 安士 ) 不含酒精或咖啡因的液體方可預防腎臟疾病。請和醫生/護士討論您的確切飲用量。
  - 經常驗血，檢查腎功能
- 白細胞數量減少。若出現如下症狀，請和醫生聯絡：
  - 發燒
  - 新出現咳嗽症狀
- 紅細胞數量減少。如果您感到：
  - 頭暈
  - 氣促
  - 特別累，請和醫生聯絡。
- 血小板數量減少。若出現如下症狀，請和醫生聯絡：
  - 出血
  - 出現新的淤傷



- 皮膚上有小紅點
- 沒胃口或食物的味道改變
- 聽力問題。若出現如下症狀，請和醫生聯絡：
  - 聽力障礙，特別是音調較高的聲音
  - 耳鳴
- 手指和/或腳趾刺痛。若發生這種情況，請告訴醫生。
- 首次治療約 2 週後開始出現暫時性脫髮。頭髮會重新長起來。

**請注意：**

用 cisplatin ( 順鉑 ) 治療時，請和您的醫生討論避孕 ( 節育 ) 措施和/或家庭規劃服務。