



Cyclophosphamide (Cytosan[®], Neosar[®])

學名:cyclophosphamide (環磷酰胺)

藥品名:Cytosan[®], Neosar[®]

用途: Cyclophosphamide (環磷酰胺) 是一種化療藥物，可用來治療特定類型的癌症，這種藥物透過干擾細胞繁殖和生長，防止癌細胞生長或擴散。

給藥方式:

- Cyclophosphamide (環磷酰胺) 有丸劑，可以口服，應在早上服用。如果您不是自己給藥，處理藥物時一定要戴上用完即棄的手套。您必須將藥丸整顆吞下，**不要掰開或碾碎藥丸！**
- Cyclophosphamide (環磷酰胺) 可由醫院或癌症治療中心受過專門訓練的護士透過靜脈(IV)給藥。

可能的副作用:

- 輕微的噁心和嘔吐
- 沒胃口
- 膀胱發炎，可能會出血
 - 若出現如下症狀，請告訴醫生:
 - 尿液呈粉紅色
 - 小便疼痛
 - 排尿困難
 - 要預防膀胱炎症，您必須:
 - 每天喝 8 至 10 杯 (8 安士) 不含酒精、咖啡因的液體。請和醫生/護士討論您的確切飲用量。
 - 經常排尿，特別是睡覺時
- 白細胞數量減少。若出現如下症狀，請和醫生聯絡:
 - 發燒
 - 新出現咳嗽症狀
- 紅細胞數量減少。如果您感到:



- 頭暈
- 氣促
- 特別累，請和醫生聯絡。
- 血小板數量減少。若出現如下症狀，請和醫生聯絡：
 - 出血
 - 出現新的淤傷
 - 皮膚上有小紅點
- 首次治療約 2 週後開始出現暫時性脫髮。頭髮會重新長起來。

請注意:

1. Cyclophosphamide (環磷酰胺) 可能會和其他藥物產生抵觸，例如稀血藥、digoxin (地高辛) (Lanoxin)。如果您正服用這些藥物，請和您的醫生討論。
2. Cyclophosphamide (環磷酰胺) 可能會導致永久不育症，影響您的生育能力 (不論男、女)。開始用 cyclophosphamide (環磷酰胺) 治療前，請和您的醫生討論避孕 (節育) 措施和/或家庭規劃服務。
3. 除您自己之外，如果其他人要接觸藥丸，必須戴上用完即棄的手套。
4. 您必須將藥丸整顆吞下，**不要掰開或碾碎藥丸！**