



## Bleomycin (Blenoxane<sup>®</sup>)

學名:bleomycin ( 博萊霉素 )

藥品名:Blenoxane<sup>®</sup>

**用途:** Bleomycin ( 博萊霉素 ) 是一種化療藥物，可用來治療特定類型的癌症，還可以用來治療或預防某些癌症引起的肺積液。這種藥物透過干擾細胞繁殖和生長，防止癌細胞生長或擴散。

**給藥方式:**

- 由醫院或癌症治療中心受過專門訓練的護士透過靜脈(IV)給藥。
- 由醫院或癌症治療中心受過專門訓練的護士透過肌肉或皮下注射 ( 針劑 ) 給藥。
- 用胸管透過胸腔 ( 進入肺部 ) 給藥，治療惡性胸腔積液 ( 肺積液 ) 和預防反覆型胸腔積液。本治療須由醫生在醫院實施。

**可能的副作用:**

- 治療後數小時內可能會發熱伴有寒顫，並可能持續幾個小時。請向醫生或護士瞭解發生這種情況時應採取的措施。
- 治療期間或治療後數小時可能會出現低血壓現象。如果您覺得：
  - 頭暈
  - 虛弱請告訴醫生或護士。
- 治療後 2 至 10 天內可能會發生口腔潰瘍。難受時可以用藥來緩解。如果發生口腔潰瘍：
  - 不要用任何含酒精的產品，包括漱口水
  - 用軟毛刷刷牙
  - 不要喝酒
  - 不要吃辣味或酸味食物
- 皮膚反應：
  - 指甲或手掌上出現黑色條紋
  - 皮疹



- 瘙癢
- 輕微的噁心和嘔吐
- 沒胃口或食物的味道改變
  
- 透過靜脈給藥或注射方式接受 Bleomycin ( 博萊霉素 ) 治療的患者肺部可能會出現疤痕。若出現如下症狀，請在下次治療前告訴醫生/護士：
  - 乾咳
  - 氣促/呼吸困難
  - 胸痛
- 透過胸管接受 Bleomycin ( 博萊霉素 ) 治療的患者通常會發燒，胸管植入部位感到疼痛或深呼吸時感到疼痛。多數情況下，醫生會給您開鎮痛藥的處方。請向護士或醫生報告所有症狀。

**請注意：**

接受 bleomycin ( 博萊霉素 ) 治療時，請和您的醫生討論避孕 ( 節育 ) 措施和/或家庭規劃服務。