



Capecitabine (截瘤達) (Xeloda®)

學名： Capecitabine (截瘤達)

藥物名稱： Xeloda®

用途： Xeloda (希羅達) 是一種化療藥物，用於治療某些類型的癌症，包括轉移性乳癌 (已擴散到身體的其他部位的乳癌)、某些時期的結腸癌和轉移性結腸癌 (已擴散到身體其他部位的結腸或直腸癌)。

形式： 藥丸：

- 150mg (淺桃色)
- 500mg (桃色)

用法：

- 按照醫師的指示服用 Xeloda (希羅達)。醫師會為您早晚使用的劑量確定藥丸組合。
- 在服用之前確保服用的是正確的藥丸 (看顏色)。
- 飯後 30 分鐘內服用 Xeloda。
- 每次服用希羅達時喝 8 盎司水。
- 若您漏服一劑藥物，只需略過並致電醫師。請勿在當天晚些時候補服。請勿服用雙倍劑量。
- 若您有攝取葉酸，請告知醫師。葉酸會影響 Xeloda (希羅達) 對您的藥效。
- Xeloda (希羅達) 通常要連續服用 14 天，然後停用 7 天，讓身體得到休息。
- 將您出現的任何副作用告訴醫師。
- 醫師會根據您出現的副作用改變藥物用量或服用天數。

可能的副作用：

- 輕微腹瀉 (一天內拉肚子少於 4 次)
- 噁心和/或嘔吐
- 口瘡



- 絞痛和/或便秘
- 食慾不振
- 手掌或腳底刺痛、麻木、疼痛、腫脹或紅腫
- 皮疹、皮膚乾燥和/或皮膚發癢
- 疲勞 (感覺疲倦)
- 虛弱
- 暈眩
- 頭痛
- 發燒

重要事項： 若出現以下情況，請立即致電您的醫師：

- 中度或嚴重腹瀉 (一天內拉肚子多於 4 次)
- 口腔中度疼痛或紅腫、腫脹或口瘡
- 手掌或腳底刺痛、麻木、疼痛、腫脹或紅腫
- 嘔吐