



Dacarbazine (DTIC[®])

學名:dacarbazine (達卡巴嗪)

藥品名:DTIC[®]

用途: Dacarbazine (達卡巴嗪) 是一種化療藥物，可用來治療特定類型的癌症，這種藥物透過干擾細胞繁殖和生長，防止癌細胞生長或擴散。

給藥方式:

- 由醫院或癌症治療中心受過專門訓練的護士透過靜脈(IV)給藥。

可能的副作用:

- 中度噁心和嘔吐。可用藥物預防或控制嘔吐。
- 若出現如下症狀，請立即告訴醫生/護士：
 - 輸注部位疼痛或有燒灼感
 - 面部潮紅 (發紅) 或刺痛
 - 出現紅色和/或很癢的皮疹
- 治療後 7 天內出現類似患上流感的症狀。出現如下情況時，請告訴醫生：
 - 身體疼痛
 - 發燒到華氏 100.4 度或更高
 - 感到非常累
- 白細胞數量減少。若出現如下症狀，請和醫生聯絡：
 - 發燒
 - 新出現咳嗽症狀
- 紅細胞數量減少。如果您感到：
 - 頭暈
 - 氣促
 - 特別累，請和醫生聯絡。
- 血小板數量減少。若出現如下症狀，請和醫生聯絡：
 - 出血
 - 出現新的淤傷



- 皮膚上有小紅點
- 首次治療約 2 週後開始出現暫時性脫髮。頭髮會重新長起來。
- 皮膚對陽光可能會更敏感，更容易曬傷。避免陽光直接照射，不要用太陽燈日光浴床。塗抹 SPF 值達 30 或更高的防曬霜。穿能防止曬傷的服裝，包括長褲、長袖衣服，戴上帽子和太陽鏡。

請注意:

用 dacarbazine (達卡巴嗪) 治療時，請和您的醫生討論避孕 (節育) 措施和/或家庭規劃服務。