



Cisplatin (Цисплатин) (Platinol®)

Международное непатентованное наименование препарата: Cisplatin (Цисплатин)

Наименование препарата: Platinol®

Показания: Cisplatin (Цисплатин) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения ряда онкологических заболеваний. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли.

Способы применения:

- Внутривенное введение квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).
- Интраперитонеальное введение в брюшную полость квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).

Возможные побочные эффекты:

- Тошнота и рвота. Предотвратить или контролировать тошноту можно при помощи медицинских препаратов.
 - Появляется через 4-12 часов после введения.
 - Может продолжаться в течение 2-4 дней.
- Запоры.
- Проблемы с почками.
 - Для предотвращения возникновения проблем с почками вы ДОЛЖНЫ ежедневно выпивать как минимум 8-10 стаканов (8 унций) безалкогольных, не содержащих кофеин жидкостей. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или медсестрой о том, какое именно количество жидкости вам следует потреблять.
 - Вы будете регулярно сдавать анализ крови для определения функции почек.
- Снижение уровня лейкоцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - жар;
 - кашель.
- Снижение уровня эритроцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - головокружение;
 - одышка;
 - чрезмерная утомляемость.
- Низкое содержание тромбоцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - кровотечение;
 - синяки;



- точечная красная сыпь на коже.
- Потеря аппетита или изменение вкусовых ощущений.
- Нарушение слуха. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - нарушение слуха, особенно снижение способности воспринимать высокие звуки;
 - звон или жужжание в ушах.
- Покалывание в пальцах рук и/или ног. Сообщите врачу, если у вас появились перечисленные симптомы.
- Временное выпадение волос приблизительно через 2 недели после первого введения препарата. Это явление временное и обратимое.

Важно!

При приеме препарата Cisplatin (Цисплатин) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (о методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.