



Prednisone (Deltasone®, Orasone®, Prednicen-M®, Liquid Pred®)
(Преднизон (Дельтазон®, Оразон®, Предницен-М®, Ликвид Пред®))

Наименование препарата: Deltasone®, Orasone®, Prednicen-M®, Liquid Pred®
(Дельтазон®, Оразон®, Предницен-М®, Ликвид Пред®)

Непатентованное наименование препарата: prednisone (преднизон)

Показания: Prednisone (преднизон) — это стероидный препарат, используемый для уменьшения воспаления (отечности) в различных частях тела. Кроме того, его можно использовать для устранения тошноты и рвоты, связанных с химиотерапией, и для повышения аппетита у онкологических пациентов. Prednisone (преднизон) является аналогом гормона, который вырабатывается надпочечниками (железами, расположенными над почками).

Форма выпуска: таблетки.

Применение:

- Prednisone (преднизон) следует принимать по назначению врача. Ваш врач подберет необходимую дозу и составит график приема препарата.
- Prednisone (преднизон) следует принимать либо **ВО ВРЕМЯ ЕДЫ**, либо **С МОЛОКОМ**.
- **ИСКЛЮЧИТЕ** употребление алкоголя во время лечения препаратом Prednisone (преднизон).
- Принимайте Prednisone (преднизон) точно в соответствии с назначением врача. Если вы не приняли очередную дозу препарата, позвоните своему врачу для получения указаний.
- **НЕ СЛЕДУЕТ** внезапно прекращать прием препарата Prednisone (преднизон) без распоряжения врача.
- Сообщите всем поставщикам медицинских услуг о том, что вы принимаете в настоящее время или недавно прекратили прием препарата Prednisone (преднизон). Это *крайне важно*, если вы проходите лечение тяжелой инфекции или вам назначена хирургическая операция.
 - Prednisone (преднизон) подавляет (замедляет) работу иммунной системы. Это значит, что вашему организму будет очень сложно противостоять инфекциям.
 - В результате приема препарата Prednisone (преднизон) сложнее протекает период послеоперационной реабилитации. Организму требуется больше времени на восстановление.



- Лечение препаратом Prednisone (преднизон) проводится под строгим контролем врача. Сообщайте врачу о появлении любых симптомов или побочных эффектов.

Возможные побочные эффекты:

- повышение уровня лейкоцитов в крови, уровня сахара в крови и артериального давления; ваш врач будет регулярно проверять данные показатели;
- повышение аппетита;
- задержка жидкости (ощущение вздутости);
- отеки рук и ног;
- набор веса;
- повышенный риск инфекции;
- раздражительность желудка;
- кровоточащая язва; ее могут сопровождать следующие симптомы: боль в животе, рвота, кровь в кале;
- нарушение сна;
- гиперактивность (активность выше обычной нормы, невозможность оставаться в покое и неподвижности);
- повышенная раздражительность, перепады настроения, психоз (дезориентация, галлюцинации, потеря связи с реальностью);
- дегтеобразные каловые массы черного цвета (немедленно позвоните врачу).

В результате длительного приема препарата Prednisone (преднизон) могут появиться следующие симптомы:

- повышенный рост волос на лице;
- переломы костей, несущих нагрузку, т. е. костей, на которые распределяется ваш вес (ноги и бедра);
- глаукома (заболевание глаз, которое может привести к потере зрения и слепоте);
- повышенный риск тромбообразования;
- отечность лица.

Важно!

Немедленно позвоните врачу, если у вас появились любые из описанных выше симптомов. Данные побочные эффекты поддаются лечению и не являются поводом для беспокойства.