

Fondaparinux sodium (磺達肝癸鈉) (Arixtra[®])

藥物名稱：Arixtra[®]

通用名：Fondaparinux sodium (磺達肝癸鈉)

功效： Fondaparinux sodium (磺達肝癸鈉) (Arixtra[®])是一種抗凝血劑或稀血劑。「抗」的意思是阻止，「凝血」指血栓形成，因此這種藥物可防止血栓形成。Arixtra[®]用於治療或預防血栓。請洽詢您的醫生，瞭解服用 Arixtra[®]的原因。

劑型： Arixtra[®]為預裝注射劑（針劑）。下表列示 Arixtra[®]的劑量和顏色。

劑量	顏色
2.5 毫克	藍色
5 毫克	橙色
7.5 毫克	洋紅色 (紫紅色)
10 毫克	紫色

服用方法：

- 醫生會告訴您如何服用 Arixtra[®]。醫生會開具處方，說明準確的劑量以及服用次數。請務必遵守醫囑。
- Arixtra[®]透過皮下注射輸送到胃中。
- 為了預防不適，請勿每次在相同的地方注射（打針）。
- 為了預防瘀腫，請勿抓撓注射（打針）處。
- 若忘記服藥，應在記起後盡快注射。若已快到注射下一劑的時間，應忽略上一劑，然後按正常的時間注射。不要同時注射兩劑。向醫生說明忘記注射藥物的情況。
- 離開醫院之前，護士會教您或您的家人如何注射（打針）。回家之前務必詢問和瞭解如何自我注射（打針）。
- 完全按護士教您的方法為自己注射（打針）。不要停止注射 Arixtra[®]，直到醫生告訴您可以停止。



- 離開醫院之前，醫生會給您一個特別的容器，用於存放用過的注射器（針頭）。請務必將用過的注射器放到該容器中。當您的 Arixtra[®]注射完後，請詢問您的醫療團隊，瞭解如何處理該容器。**切勿將針頭或塑膠容器扔到垃圾堆！**

可能的副作用：

- 注射（打針）處輕度不適、疼痛、瘀腫、發紅或腫脹。
- 若有下列症狀，立即打電話給您的醫生：
 - 過敏反應的徵兆：
 - 皮疹或蕁麻疹
 - 搔癢或腫脹，特別是面部、舌頭或咽喉
 - 嚴重暈眩
 - 呼吸困難
 - 胸悶
 - 小便或大便帶血（大便呈紅色或黑褐色）
 - 氣促或呼吸困難
 - 吐血或咳血（呈咖啡渣狀）
 - 異常瘀腫或出血，包括經血過量
 - 突然嚴重頭痛，並有視力、語言或行走困難
 - 發熱

重要事項：

- 除非醫生囑咐，注射 Arixtra[®]期間不要服用 Aspirin（阿斯匹靈）或 ibuprofen（布洛芬）。
- 注射 Arixtra[®]期間不要服用草藥，包括茶。
- 注射 Arixtra[®]期間不要從事接觸或衝撞性運動。
- 注射 Arixtra[®]期間不要喝酒。
- 從藥房買到 Arixtra[®]之後，檢查注射器的顏色。除非改變劑量，否則顏色應當相同。