



抗凝血治療指南：  
出院說明

抗凝血主診醫生姓名： \_\_\_\_\_

醫生電話號碼 ( ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

您正在服用下列抗凝血劑 ( 稀血劑 )：

warfarin ( 華法林 ) (Coumadin<sup>®</sup>): 劑量: \_\_\_\_\_

enoxaparin ( 依諾肝素鈉 ) (Lovenox<sup>®</sup>): 劑量: \_\_\_\_\_

fondaparinux ( 磺達肝癸鈉 ) (Arixtra<sup>®</sup>): 劑量: \_\_\_\_\_

其他抗凝血劑： \_\_\_\_\_ 劑量: \_\_\_\_\_

服用 warfarin (華法林) (Coumadin<sup>®</sup>)期間務必經常接受血液檢查，以確保您服用正確的藥量。若藥量過多，您會很容易出血。若藥量不足，可能會有更多的血栓形成。檢查血栓情況的特別血液檢查稱為國際正常化比值檢查，簡稱 INR。醫生將根據您服用稀血劑的原因，檢查您的 INR 比值是否處於正常範圍 ( 稱為治療範圍 )。若檢查結果不處於治療範圍內，醫生可能會調整您的劑量。**您需要在離開醫院後 3 天內接受 INR 檢查。**

服用 warfarin (華法林) (Coumadin<sup>®</sup>)後您的治療範圍是： \_\_\_\_\_

血液檢查的日期： \_\_\_\_\_

血液檢查的地點： \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

查詢結果以及服藥劑量變化的聯絡人：

• 姓名： \_\_\_\_\_

• 電話號碼： ( ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

若您被轉診到紐約大學(Langone)醫院抗凝血服務科的門診服務，請盡快致電(212) 263-0980 安排預約。如果您想到本院就診，請與您的醫生商量。



爲了您的安全，請務必按時接受血液檢查。這是您離開醫院之後的責任。若您離開醫院之後沒有接受合適的護理和血液檢查，則可能增加出血或血栓形成的風險。

若您對抗凝血治療有疑問或顧慮，請與您的醫生聯絡。若需要緊急護理，請前往就近的急診室。

紐約大學(Langone)醫院抗凝血管理服務  
317 East 34 Street 8<sup>th</sup> floor New York, New York 10016  
電話: (212) 262-0980