



Fondaparinux sodium (фондапарин натрия) (Arixtra[®])

Наименование препарата: Arixtra[®]

Непатентованное наименование препарата: Fondaparinux sodium
(фондапарин натрия)

Показания: Fondaparinux sodium (фондапарин натрия) (Arixtra[®]) — это антикоагулянт, т.е. препарат для разжижения крови. *Анти* означает «против», а *коагулянт* означает «способствующий свертыванию», то есть данный препарат препятствует свертыванию крови. Arixtra[®] используется для лечения и предотвращения образования тромбов. Обсудите с вашим врачом причину, по которой вы принимаете препарат Arixtra[®].

Форма выпуска: Arixtra[®] выпускается в предварительно наполненном шприце для инъекций (уколов). В приведенной ниже таблице представлены дозировка и цвет препарата Arixtra[®].

Доза	Цвет
2,5 мг	синий
5 мг	оранжевый
7,5 мг	пурпурный (фиолетово-красный)
10 мг	фиолетовый

Применение:

- О применении препарата Arixtra[®] вам расскажет врач. Он выпишет вам рецепт на получение точной дозы и объяснит, как часто следует принимать препарат. Неукоснительно выполняйте указания врача.
- Arixtra[®] вводится подкожно (субкутанно) в область живота.
- Для предотвращения раздражения НЕ делайте инъекцию (укол) в одно и то же место.
- Для предотвращения образования синяков НЕ растирайте место инъекции (укола).
- Если вы забыли принять дозу препарата, примите ее сразу, как только вспомните. Если вы вспомнили об этом, когда до введения следующей дозы осталось недолго, не принимайте пропущенную дозу и следуйте обычному графику введения препарата. НЕ следует удваивать следующую дозу. Если вы пропустили дозу, позвоните врачу.
- Перед выпиской медсестра покажет вам или члену вашей семьи, как делать инъекцию (укол). Обязательно задайте интересующие вас вопросы и научитесь делать себе инъекцию (укол) до выписки.



- Делайте себе инъекцию (укол) точно таким же образом, как вам показывали. НЕ прекращайте введение препарата Arixtra® без указания врача.
- Перед выпиской вам выдадут специальный контейнер для использованных шприцов (игл). Обязательно складывайте использованные шприцы в этот контейнер. После того как вы прекратите принимать препарат Arixtra®, спросите у медработников, как утилизировать контейнер. **НЕ выбрасывайте шприцы или пластмассовый контейнер в мусор!**

Возможные побочные эффекты:

- незначительное раздражение, боль, синяки, краснота или припухлость в месте инъекции (укола).
- Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - признаки аллергической реакции:
 - сыпь или крапивница;
 - зуд или отек, особенно на лице, языке или в горле;
 - сильное головокружение;
 - затрудненное дыхание;
 - тяжесть в груди;
 - кровь в моче или кале (моча или кал красного или черного цвета, дегтеобразный стул);
 - одышка или затрудненное дыхание;
 - рвота с кровью или кровохаркание;
 - необычные кровоподтеки или сильное кровотечение, в том числе менструальное;
 - резкая сильная головная боль с расстройством зрения, речи и ходьбы;
 - повышенная температура.

Внимание!

- НЕ принимайте aspirin (аспирин) или ibuprofen (ибупрофен) одновременно с препаратом Arixtra®, если это не предписано вашим врачом.
- НЕ принимайте травяные препараты, включая травяные чаи, одновременно с Arixtra®.
- НЕ занимайтесь контактными видами спорта во время лечения препаратом Arixtra®.
- НЕ употребляйте алкоголь во время лечения препаратом Arixtra®.
- При получении препарата Arixtra® в аптеке проверяйте цвет шприцов с препаратом. Если вам не изменили дозировку, цвет должен остаться прежним.