



Fondaparinux sodium (Arixtra[®])

Nombre del medicamento: Arixtra[®]

Nombre genérico: fondaparinux sodium

Objetivo: La fondaparinux sodium (Arixtra[®]) es un anticoagulante. "Anti" significa *contra* y "coagulante" significa *formación de coágulos*, por lo tanto este medicamento dificulta la formación de coágulos sanguíneos. Arixtra[®] se utiliza para tratar o evitar los coágulos sanguíneos. Hable con su médico para saber por qué razón usted está tomando Arixtra[®].

Forma: Arixtra[®] viene como inyección pre-envasada. El cuadro muestra las dosis y colores de Arixtra[®].

Dosis	Color
2.5 mg	Azul
5 mg	Anaranjado
7.5 mg	Magenta (rojo púrpura)
10 mg	Violeta

Cómo tomarlo:

- Su médico le indicará como tomar su Arixtra[®]. Se le dará una receta con la dosis exacta y se le indicará con qué frecuencia debe tomarlo. Asegúrese de seguir las instrucciones del médico.
- Arixtra[®] se aplica como inyección debajo de la piel (subcutánea) en su estómago.
- Para evitar irritaciones, NO aplique la inyección en el mismo lugar todos los días
- Para evitar hematomas, NO frote en el lugar de la inyección.
- Si se olvida una dosis, aplíquese la tan pronto como se dé cuenta. Si ya es prácticamente el momento de la dosis siguiente, saltee la dosis que olvidó y vuelva a retomar el horario habitual. NO tome una dosis doble. Informe a su médico sobre dosis olvidadas.
- Antes de salir del hospital, su enfermera le enseñará a usted o a un familiar cómo debe aplicarse la inyección. Asegúrese de hacer todas las preguntas necesarias y de entender bien cómo debe aplicarse la inyección antes de irse a su casa.
- Aplíquese la inyección exactamente en la forma en que le enseñaron. NO deje de usar Arixtra[®] hasta que su médico se lo indique.
- Antes de irse del hospital, recibirá un recipiente especial para colocar las jeringas (agujas) usadas. Asegúrese de colocar las jeringas usadas en este contenedor. Pregunte a su equipo de



atención de salud cómo desechar el recipiente cuando termine de usar el Arixtra®. **NO PUEDE arrojar las jeringas ni el recipiente plástico con el resto de la basura de su casa.**

Posibles efectos secundarios:

- Irritación leve, dolor, hematomas, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección.
- Llame a su médico inmediatamente si tiene:
 - signos de una reacción alérgica:
 - erupción o urticaria
 - picazón o hinchazón, especialmente en la cara, lengua o garganta
 - fuertes mareos
 - dificultades para respirar
 - opresión en el pecho
 - sangre en la orina o deposiciones intestinales (rojas o negruzcas)
 - falta de aire o dificultades para respirar
 - vómitos o tos con sangre (con aspecto de granos de café)
 - hematomas o hemorragias inusuales, incluso sangrado menstrual abundante
 - dolor de cabeza intenso y repentino, con problemas de visión, habla o al caminar
 - fiebre

Importante:

- NO tome aspirina o ibuprofeno mientras tome Arixtra® salvo que se lo indique el médico.
- NO tome productos herbáceos, incluso tés, mientras tome Arixtra®.
- NO practique deportes de contacto mientras tome Arixtra®.
- NO consuma alcohol mientras realiza tratamiento con Arixtra®.
- Verifique el color de las jeringas cuando adquiera el Arixtra® en la farmacia. Salvo que haya cambiado de dosis, el color deberá ser el mismo.