



Docetaxel (Taxotere®)

Nombre genérico: Docetaxel

Nombre del medicamento: Taxotere®

Objetivo: Docetaxel es una droga para quimioterapia que se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer. Esta medicina interfiere con la reproducción y el crecimiento celular y de este modo impide que el cáncer progrese o se propague.

Cómo se administra la droga:

- Por vía intravenosa (IV), aplicada en una vena por una enfermera calificada en el hospital o centro de cáncer.

Efectos colaterales posibles:

- **Informe a su médico o enfermera inmediatamente si tiene algunos de los siguientes síntomas durante su tratamiento de infusión con docetaxel**
 - rubor (enrojecimiento) de la cara
 - dolor en el pecho
 - Dificultad para respirar
- Náuseas de leves a moderadas, vómitos o diarrea.
- Disminución del conteo de glóbulos blancos. Llame a su médico si tiene:
 - fiebre
 - tos de reciente aparición
- Disminución del conteo de glóbulos rojos. Llame a su médico si siente:
 - mareos
 - falta de aire
 - cansancio excesivo
- Disminución del conteo de plaquetas. Llame a su médico si tiene:
 - sangrado
 - nuevos hematomas
 - pequeños puntos rojos en la piel
- Pérdida temporal del cabello que comienza aproximadamente 2 semanas después del primer tratamiento. Su cabello volverá a crecer.
- Retención de líquidos (sensación de hinchazón)
 - Podría tener:
 - aumento de peso
 - hinchazón en la parte inferior de las piernas (edema)
 - Hay medicamentos disponibles para ayudar a prevenir o controlar la hinchazón.
- Hormigueo o ardor en las manos, pies o parte inferior de las piernas.
- Reacciones cutáneas:
 - sarpullido en las manos o en los pies
 - picazón
 - cambio de color de las uñas

Importante: hable con su médico sobre métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras esté recibiendo docetaxel.