



Docetaxel (доцетаксел) (Taxotere®)

Международное непатентованное наименование препарата: docetaxel (доцетаксел)

Наименование препарата: Taxotere®

Показания: Docetaxel (доцетаксел) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения ряда онкологических заболеваний. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли.

Способы применения:

- Внутривенное введение квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).

Возможные побочные эффекты:

- **Немедленно сообщите врачу или медсестре, если во время внутривенного введения препарата Docetaxel (доцетаксел) возникнет какой-либо из ниже перечисленных симптомов:**
 - приливы крови к лицу (покраснение);
 - боль в груди;
 - затрудненное дыхание.
- Слабая или умеренная тошнота, рвота, диарея.
- Снижение уровня лейкоцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - жар;
 - кашель.
- Снижение уровня эритроцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - головокружение;
 - одышка;
 - чрезмерная утомляемость.
- Низкое содержание тромбоцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - кровотечение;
 - синяки;
 - точечная красная сыпь на коже.
- Временное выпадение волос приблизительно через 2 недели после первого введения препарата. Это явление временное и обратимое.
- Задержка жидкости (отечность).
 - Вы можете заметить:
 - увеличение массы тела;
 - отечность ног ниже колена (эдема).
 - Предотвратить и контролировать отечность можно при помощи медицинских препаратов.
- Покалывание или жжение в кистях рук, ступнях или ногах ниже колен.
- Кожные реакции:
 - сыпь на кистях рук или ступнях;
 - зуд;
 - изменение цвета ногтей.

Внимание! При приеме препарата Docetaxel (доцетаксел) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.