



Docetaxel (多烯紫杉醇) (Taxotere®)

通用名：Docetaxel (多烯紫杉醇)

藥物名稱：Taxotere®

功效： 多烯紫杉醇是一種化療藥物，用於治療某些癌症。它透過干擾細胞增殖和生長，抑制癌細胞生長或擴散。

用藥方法：

- 由醫院或癌症中心受過專業訓練的護士透過靜脈(IV)注射輸送到血管中。

可能的副作用：

- 若在靜脈注射多烯紫杉醇期間感到下列任何症狀，應立即告訴您的醫生：
 - 面部發紅 (臉紅)
 - 胸痛
 - 呼吸困難
- 輕度至中度噁心、嘔吐和腹瀉。
- 白血球計數低。若有下列症狀，應打電話給您的醫生：
 - 發熱
 - 新發咳嗽
- 紅血球計數低。若有下列症狀，應打電話給您的醫生：
 - 眩暈
 - 氣促
 - 極度疲倦
- 血小板計數低。若有下列症狀，應打電話給您的醫生：
 - 出血
 - 新發瘀腫
 - 皮膚出現小紅點
- 首次治療後大約 2 個星期開始暫時掉頭髮。您的頭髮會長回來。
- 積液 (感覺腫脹)
 - 您可能感覺到：
 - 體重增加



- 小腿腫脹 (浮腫)
 - 可服用藥物來預防或控制腫脹。
- 手、足或小腿刺痛或燒灼感。
- 皮膚反應：
 - 手或足部皮疹
 - 發痒
 - 指甲顏色改變

重要事項：注射多烯紫杉醇期間請向您的醫生說明避孕 (節育) 和/或家庭計劃情況。