



Doxorubicina (Adriamycin®)

Nombre genérico: doxorubicina

Nombre del medicamento: Adriamycin®

Objetivo: La doxorubicina es un medicamento para quimioterapia que se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer. Este medicamento interfiere con la reproducción y el crecimiento celular y de este modo impide que el cáncer progrese o se propague.

Cómo se suministra la droga:

- Por vía intravenosa (IV), aplicada en una vena por una enfermera calificada en el hospital o centro de cáncer.

Posibles efectos secundarios:

- Náuseas, vómitos o pérdida de apetito moderados.
 - Pueden durar de 24 a 48 horas después del tratamiento.
 - Hay medicinas disponibles para ayudar a prevenir o controlar las náuseas.
- Dolor o daño en la piel si la medicina sale de la vena. Llame a su médico inmediatamente si tiene dolor, enrojecimiento o sensibilidad en el sitio de la infusión.
- 24 horas después del tratamiento usted notará que su orina le saldrá rosada, anaranjada, o roja porque la doxorubicina es una medicina de color rojo. .
- Pueden aparecer llagas en la boca dentro de los 7 días después del tratamiento. Hay medicinas disponibles para ayudar a calmar cualquier molestia que se presente. Si tiene vejigas o ampollas en la boca:
 - no utilice productos que contengan alcohol, incluyendo enjuagues bucales
 - use un cepillo de dientes suave
 - no beba alcohol
 - no consuma alimentos picantes o altamente condimentados ni ácidos
- Su piel será más sensible al sol y tendrá más probabilidades de sufrir quemaduras. Evite la exposición directa a la luz solar y NO utilice camas solares. Use bloqueador solar con factor de protección solar (SPF) de por lo menos 30. Utilice ropa que lo proteja del sol, por ejemplo pantalones largos, mangas largas, sombrero y anteojos de sol.
- Baja de glóbulos blancos. Llame a su médico si tiene:
 - fiebre
 - tos repentina -
- Baja de glóbulos rojos. Llame a su médico si siente:
 - mareos
 - falta de aire



- cansancio excesivo
- Baja de plaquetas. Llame a su médico si tiene:
 - sangrado
 - nuevos hematomas
 - pequeños puntos rojos en la piel
- Pérdida temporal del cabello que comienza aproximadamente 2 semanas después del primer tratamiento. Su cabello volverá a crecer.
- Cambios en la piel:
 - Oscurecimiento de la piel en los sitios en los que ha recibido radiación anteriormente. Informe a su médico si usted ha recibido tratamientos de radiación.
 - Aparición de líneas blancas, oscurecimiento o aflojamiento de las uñas.
- Cambios en la frecuencia y el ritmo cardíacos
 - No es un efecto secundario común
 - Puede producirse después de que usted haya recibido grandes cantidades de doxorubicina
 - Su médico observará la función cardíaca con estudios especiales
 - Llame a su médico o enfermera de inmediato si tiene:
 - dificultad para respirar
 - aumento de peso
 - hinchazón de las manos o en los pies
 - tos

Importante:

1. Hable con su médico sobre métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras esté recibiendo doxorubicina.
2. Infórmele a su médico si ha sido tratado con doxorubicina en el pasado.
3. NO amamante mientras esté recibiendo doxorubicina. La doxorubicina pasa al bebé por medio de la leche materna.