



## Doxorubicin ( 多柔比星 ) (Adriamycin®)

通用名 : Doxorubicin ( 多柔比星 )

藥物名稱 : Adriamycin®

功效 : 多柔比星是一種化療藥物，用於治療某些癌症。它透過干擾細胞增殖和生長，抑制癌細胞生長或擴散。

用藥方法 :

- 由醫院或癌症中心受過專業訓練的護士透過靜脈(IV)注射輸送到血管中。

可能的副作用 :

- 中度噁心、嘔吐和食慾不振
  - 在治療之後可能持續 24 至 48 小時。
  - 可服用藥物來預防或控制噁心。
- 若藥物從靜脈洩漏，可能造成疼痛或皮膚損傷。若注射處感到疼痛、發紅或壓痛，應立即打電話給您的醫生。
- 由於多柔比星為紅色，治療後 24 小時內尿液可能呈粉紅、橙色或紅色。
- 治療後 7 天內可能出現口腔潰瘍。可服用藥物來抑制不適。如有口腔潰瘍：
  - 不要使用任何含酒精的產品，包括嗽口水
  - 應使用軟毛牙刷
  - 不要飲酒
  - 不要吃辛辣或酸性食物
- 您的皮膚將對陽光敏感，容易灼傷。避免陽光直射，不要使用日光浴床。擦防曬霜，防曬係數應為 30 或以上。選擇可隔離陽光的衣服，包括長褲、長袖衫、帽子和墨鏡。
- 白血球計數低。若有下列症狀，應打電話給您的醫生：
  - 發熱



- 新發咳嗽
- 紅血球計數低。若有下列症狀，應打電話給您的醫生：
  - 眩暈
  - 氣促
  - 極度疲倦
- 血小板計數低。若有下列症狀，應打電話給您的醫生：
  - 出血
  - 新發瘀腫
  - 皮膚出現小紅點
- 首次治療後大約 2 個星期開始暫時掉頭髮。您的頭髮會長回來。
- 皮膚變化：
  - 以往接受放射治療的皮膚會變黑。如果您以前曾接受放射治療，應向您的醫生說明。
  - 指甲上出現白色條紋、指甲變黑或鬆動
- 心率和心律變化
  - 並非常見的副作用
  - 在注射大量多柔比星後可能出現
  - 您的醫生將透過特別檢查來監控您的心臟功能
  - 若有下列症狀，立即打電話給您的醫生：
    - 呼吸困難
    - 體重增加
    - 手或足部腫脹
    - 咳嗽

**重要事項：**

1. 注射多柔比星期間請向您的醫生說明避孕（節育）和/或家庭計劃情況。
2. 如果您以前曾接受多柔比星治療，應向您的醫生說明。
3. 注射多柔比星期間不要哺乳。多柔比星可經由母乳被嬰兒吸收。