



## Doxorubicin (доксорубицин) (Adriamycin®)

Международное непатентованное наименование препарата: doxorubicin (доксорубицин)

Наименование препарата: Adriamycin®

**Показания:** Doxorubicin (доксорубицин) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения ряда онкологических заболеваний. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли.

**Способы применения:**

- Внутривенное введение квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).

**Возможные побочные эффекты:**

- Умеренная тошнота, рвота и потеря аппетита.
  - Сохраняются в течение 24–48 часов после введения препарата.
  - Предотвратить или контролировать тошноту можно при помощи медицинских препаратов.
- Боль или повреждение кожи при вытекании препарата из вены. Немедленно сообщите своему поставщику медицинских услуг о появлении боли, покраснении или болезненности в месте введения препарата.
- Моча розового, оранжевого или красного цвета в течение суток после введения препарата в связи с тем, что doxorubicin (доксорубицин) окрашен в красный цвет.
- В течение 7 дней после введения препарата могут появиться язвы в ротовой полости. С любым дискомфортом вам помогут справиться медицинские препараты. Если в ротовой полости появились язвы:
  - не используйте спиртосодержащие средства, в том числе ополаскиватель для полости рта;
  - используйте мягкую зубную щетку;
  - не употребляйте алкоголь;
  - воздержитесь от употребления острых и кислотных продуктов питания.
- Ваша кожа будет более чувствительна к воздействию солнечных лучей и более восприимчива к солнечным ожогам. Избегайте прямых солнечных лучей и НЕ посещайте солярий. Используйте солнцезащитный крем с фактором защиты 30 и выше. Носите одежду, защищающую от солнца, включая длинные брюки, длинные рукава, головной убор и солнцезащитные очки.
- Снижение уровня лейкоцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
  - жар;
  - кашель.



- Снижение уровня эритроцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
  - головокружение;
  - одышка;
  - чрезмерная утомляемость.
- Низкое содержание тромбоцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
  - кровотечение;
  - синяки;
  - точечная красная сыпь на коже.
- Временное выпадение волос приблизительно через 2 недели после первого введения препарата. Это явление временное и обратимое.
- Изменение кожных покровов:
  - потемнение кожи в местах применения лучевой терапии в прошлом; сообщите своему врачу, если вы проходили курс лучевой терапии;
  - белые полосы на ногтях, потемнение или расщатывание ногтей.
- Изменение пульса и сердечного ритма:
  - нераспространенный побочный эффект;
  - возникает после приема большого количества препарата doxorubicin (доксорубицин);
  - ваш врач будет наблюдать за функцией вашего сердца с помощью специальных исследований;
  - немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
    - затрудненное дыхание;
    - повышение массы тела;
    - отек кистей рук или ступней;
    - кашель.

**Внимание!**

1. При приеме препарата doxorubicin (доксорубицин) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.
2. Сообщите вашему врачу, если вы принимали doxorubicin (доксорубицин) ранее.
3. Во время приема препарата doxorubicin (доксорубицин) кормить грудью ЗАПРЕЩЕНО. Doxorubicin (доксорубицин) передается ребенку с грудным молоком.