

**Erythropoietin (EPO) (эритропоэтин), или Epoetin Alfa (эпоэтин альфа) (Procrit[®], Erogen[®])**

Международное непатентованное наименование препарата: erythropoietin (эритропоэтин), epoetin alfa (эпоэтин альфа)

Наименование препарата: Procrit[®], Erogen[®]

Показания: Erythropoietin (эритропоэтин) применяется для лечения анемии. Анемия — это заболевание, при котором ваш организм не вырабатывает достаточного количества эритроцитов. Erythropoietin (эритропоэтин) помогает организму вырабатывать больше эритроцитов.

Способы применения:

- Вводится с помощью подкожных инъекций (уколов) медсестрой.
- Медсестра также может научить вас или человека, ухаживающего за вами, делать эти инъекции.

Особые указания:

- Ваш врач будет контролировать уровень эритроцитов. Если уровень эритроцитов будет очень низким, вам может понадобиться переливание крови.
- Во время лечения препаратом erythropoietin (эритропоэтин) рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые железом:
 - яйца;
 - мясо;
 - овощи.
- Во время лечения препаратом erythropoietin (эритропоэтин) ваш врач может порекомендовать вам принимать железосодержащие пищевые добавки.

Возможные побочные эффекты:

- высокое артериальное давление;
- головные боли;
- болезненные ощущения в месте инъекции (укола);
- гриппоподобные симптомы (повышенная температура, мышечная боль, боль в суставах);
- диарея.

Внимание!

1. Не рекомендуется прием препарата erythropoietin (эритропоэтин) при следующих заболеваниях и состояниях:
 - a. повышенное артериальное давление, которое не поддается медикаментозному контролю;
 - b. аллергия или повышенная чувствительность к препаратам, изготовленным из клеток млекопитающих (таких как инсулин, гормон роста человека, факторы роста, в том числе лекарства, способствующие повышению уровня эритроцитов в крови);
 - c. аллергия или повышенная чувствительность к человеческому альбумину (белку).
2. Во время лечения препаратом erythropoietin (эритропоэтин) рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые железом. При необходимости проконсультироваться с диетологом обратитесь к своему врачу.
3. Данный препарат следует хранить в холодильнике. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить препарат в морозильной камере.
4. Перед инъекцией (уколом) убедитесь, что препарат прозрачен и бесцветен.
5. НЕ встряхивайте препарат.