



Etoposide (этопозид) (VP-16, Toposar[®], VePesid[®], Etopophos[®])

Международное непатентованное наименование препарата: etoposide (этопозид)

Наименование препарата: VP-16, Toposar[®], VePesid[®], Etopophos[®]

Показания: Etoposide (этопозид) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения ряда онкологических заболеваний. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли.

Способы применения:

- Etoposide (этопозид) может назначаться в виде капсул для перорального применения. Если к таблеткам прикасается кто-либо кроме вас, он должен использовать одноразовые перчатки. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проглатывайте таблетку целиком. **НЕ РАЗЛАМЫВАЙТЕ И НЕ ИЗМЕЛЬЧАЙТЕ ТАБЛЕТКУ!**
- Etoposide (этопозид) может вводиться внутривенно квалифицированным медицинским персоналом в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).

Возможные побочные эффекты:

- **Немедленно сообщите врачу или медсестре, если во время внутривенного введения препарата etoposide (этопозид) возникнет какой-либо из ниже перечисленных симптомов:**
 - приливы крови к лицу (покраснение);
 - свистящее дыхание;
 - затрудненное дыхание;
 - сдавленность в горле.
- Снижение артериального давления при внутривенном введении препарата etoposide (этопозид).
 - Медсестра будет контролировать ваше артериальное давление во время лечения.
 - Сообщите врачу или медсестре, если у вас появились следующие симптомы:
 - головокружение;
 - слабость.
- Слабая тошнота, рвота, потеря аппетита, диарея.
- Снижение уровня лейкоцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - жар;
 - кашель.
- Снижение уровня эритроцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - головокружение;
 - одышка;



- чрезмерная утомляемость.
- Низкое содержание тромбоцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - кровотечение;
 - синяки;
 - точечная красная сыпь на коже.
- Временное выпадение волос приблизительно через 2 недели после первого введения препарата. Это явление временное и обратимое.

Внимание!

1. При приеме препарата etoposide (этопозид) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (о методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.
2. Данный препарат следует хранить в холодильнике. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить препарат в морозильной камере.