

Fludarabine (флударабин) (Fludara®)

Международное непатентованное наименование препарата: fludarabine (флударабин)

Наименование препарата: Fludara®

Показания: Fludarabine (флударабин) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения определенных видов лейкемии и лимфомы. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли.

Способы применения:

- Внутривенное введение квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).

Возможные побочные эффекты:

- гриппоподобные симптомы:
 - температура 100,4°F (38°C) или выше;
 - озноб;
 - ломота в теле.
- тошнота, рвота;
- диарея;
- утомляемость (чувство сильной усталости);
- слабость;
- упадок сил;
- потеря аппетита;
- кожная сыпь;
- задержка жидкости (отечность);
 - Вы можете заметить:
 - увеличение массы тела;
 - отечность ног ниже колена (эдема).
 - Предотвратить и контролировать отечность можно при помощи медицинских препаратов.
- Снижение уровня лейкоцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - жар;
 - кашель.
- Снижение уровня эритроцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - головокружение;
 - одышка;
 - чрезмерная утомляемость.
- Низкое содержание тромбоцитов в крови. Немедленно позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - кровотечение;
 - синяки;
 - точечная красная сыпь на коже.

Внимание! При приеме препарата Fludarabine (флударабин) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.