



## Fulvestrant (фулвестрант) (Faslodex<sup>®</sup>)

Международное непатентованное наименование препарата: fulvestrant (фулвестрант)

Наименование препарата: Faslodex<sup>®</sup>

**Показания:** Fulvestrant (фулвестрант) применяется для лечения положительного гормон-рецепторного метастазирующего рака груди у женщин в постклимактерическом периоде (менструации прекратились). Положительный гормон-рецепторный метастазирующий рак груди — это вид рака груди, при котором для роста раковых клеток необходим гормон эстроген. У этих клеток есть особые рецепторы или места, которыми они прикрепляются к эстрогену. Fulvestrant (фулвестрант) прикрепляется к таким рецепторам вместо эстрогена, благодаря чему раковые клетки не могут расти и распространяться.

**Способы применения:**

- Fulvestrant (фулвестрант) вводится внутримышечно (в/м укол) в ягодицы медсестрой.
- Fulvestrant (фулвестрант) вводится один раз в 4 недели.

**Возможные побочные эффекты:**

- умеренная тошнота и рвота;
- запоры, диарея, боль в желудке;
- головная боль;
- боль в спине;
- приливы;
- боль в горле;
- болезненные ощущения и отек в месте инъекции (укола).

### **Внимание!**

1. При приеме препарата Fulvestrant (фулвестрант) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.
2. Если вы страдаете заболеваниями крови или принимаете лекарства для разжижения крови, вам необходимо сообщить об этом врачу или медсестре, поскольку данный препарат вводится с помощью инъекций (уколов).