



Carmustine (Кармустин) (BCNU, BiCNU®)

Международное непатентованное наименование препарата: Carmustine (Кармустин)

Наименование препарата: BCNU, BiCNU®

Показания: Carmustine (Кармустин) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения ряда онкологических заболеваний. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли. Carmustine (Кармустин) также используется при лечении метастазов в головной мозг.

Способы применения:

- Внутривенное введение квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).

Возможные побочные эффекты:

- Тошнота и рвота. Предотвратить или контролировать тошноту можно при помощи медицинских препаратов.
- При внутривенном введении препарата Carmustine (Кармустин) возможно появление следующих симптомов:
 - боль или жжение в месте введения препарата;
 - головная боль;
 - приливы крови к лицу (покраснение).

Немедленно сообщите врачу или медсестре, если у вас появится хотя бы один из вышеперечисленных симптомов!

- Снижение уровня лейкоцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - жар;
 - кашель.
- Снижение уровня эритроцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - головокружение;
 - одышка;
 - чрезмерная утомляемость.
- Низкое содержание тромбоцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - кровотечение;
 - синяки;
 - точечная красная сыпь на коже.
- Временное выпадение волос приблизительно через 2 недели после первого введения препарата. Это явление временное и обратимое.



- Сообщите врачу или медсестре, если у вас появились следующие симптомы:
 - пожелтение склер глаз;
 - потемнение мочи;
 - изменение цвета кожи.
- Возможно рубцевание легочной ткани. Сообщите врачу, если у вас появились следующие симптомы:
 - сухой кашель;
 - одышка или затрудненное дыхание;
 - боль в груди.

Важно!

1. Carmustine (Кармустин) может вступать в реакцию с другими препаратами, такими как Cimetidine (Циметидин) (Tagamet®), Digoxin (Дигоксин) (Lanoxin®), Phenytoin (Фенитоин) (Dilantin®), Aspirin (Аспирин). Сообщите врачу, если вы принимаете данные препараты.
2. Carmustine (Кармустин) может оказывать влияние на головной мозг, проникая через гематоэнцефалический барьер. Гематоэнцефалический барьер, как правило, предотвращает проникновение препаратов из крови в головной мозг. Сообщите медсестре или врачу, если у вас появились следующие симптомы: головная боль, жар в области лица или головокружение в процессе введения препарата Carmustine (Кармустин).
3. При приеме препарата Carmustine (Кармустин) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (о методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.