



Carmustine (BCNU, BiCNU®)

Nombre genérico: carmustine

Nombre del medicamento: BCNU, *BiCNU*®

Objetivo: Carmustine es un medicamento para quimioterapia que se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer. Este medicamento interfiere con la reproducción y crecimiento celular y de este modo impide que el cáncer progrese o se propague. Carmustine también se puede utilizar para tratar células cancerosas que se han propagado al cerebro.

Cómo se administra la droga:

- Inyectada por vía intravenosa (IV) en una vena por una enfermera calificada en el hospital o centro de cáncer.

Efectos secundarios posibles:

- Náuseas y vómitos. Hay medicamentos disponibles para ayudar a prevenir o controlar las náuseas.
- Mientras recibe Carmustine por vía intravenosa puede experimentar:
 - dolor o ardor en el sitio de infusión
 - dolor de cabeza
 - rubor (enrojecimiento) de la cara

Dígale a su médico o enfermera de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

- Disminución del recuento de glóbulos blancos. Llame a su médico si tiene:
 - fiebre
 - tos de reciente aparición
- Disminución del recuento de glóbulos rojos. Llame a su médico si tiene:
 - mareos
 - falta de aire
 - cansancio excesivo
- Disminución del recuento de plaquetas. Llame a su médico si tiene:
 - sangrado
 - nuevos hematomas
 - pequeños puntos rojos en la piel
- Pérdida temporal del cabello que comienza aproximadamente 2 semanas después del primer tratamiento. Su cabello volverá a crecer.
- Dígale a su médico o enfermera si observa:
 - color amarillo en el blanco de los ojos
 - orina oscura
 - cambios en el tono de la piel
- Se le pueden formar cicatrices en el tejido pulmonar. Dígale a su médico si tiene:



- tos seca
- falta de aire/dificultad para respirar
- dolor en el pecho

Importante:

1. Carmustine puede reaccionar con otras drogas, tales como cimetidine (Tagamet®), digoxin (Lanoxin®), phenytoin (Dilantin®), aspirina. Indíquelo a su médico si está tomando estos medicamentos
2. Carmustine puede afectar el cerebro atravesando la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica generalmente impide que los medicamentos que están presentes en la sangre ingresen al cerebro. Indíquelo a su médico o enfermera si siente dolor de cabeza, siente calor en la cara o se siente mareado durante la infusión de Carmustine.
3. Converse con su médico sobre métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras realice el tratamiento con Carmustine.