



Cyclophosphamide (Cytosan[®], Neosar[®])

Nombre genérico: cyclophosphamide

Nombre del medicamento: Cytosan[®], Neosar[®]

Objetivo: Cyclophosphamide es un medicamento para quimioterapia que se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer. Este medicamento interfiere con la reproducción y crecimiento celular y de este modo impide que el cáncer progrese o se propague.

Cómo se administra la droga:

- Cyclophosphamide se puede administrar por vía oral (por boca) en tabletas, y se debe tomar por la mañana. Si un tercero manipula las tabletas, esta persona debe utilizar guantes descartables. Usted **DEBE** tomar las píldoras enteras. **NO LAS PARTA NI LAS TRITURE.**
- Cyclophosphamide puede ser inyectada por vía intravenosa (IV) en una vena por una enfermera calificada en el hospital o centro de cáncer.

Efectos secundarios posibles:

- Náuseas o vómitos leves.
- Pérdida del apetito.
- Irritación de la vejiga con posible sangrado.
 - Dígale a su médico si tiene:
 - orina de color rosa o rojo
 - dolor al orinar
 - dificultad para orinar
 - Para prevenir la irritación de la vejiga usted **DEBE**:
 - beber de 8 a 10 vasos (8 onzas) de bebidas no alcohólicas, descafeinadas todos los días. Por favor, pregúntele a su médico o enfermera cuánto debe beber exactamente.
 - orina frecuentemente, especialmente durante la noche
- Disminución del recuento de glóbulos blancos. Llame a su médico si tiene:
 - fiebre
 - tos de reciente aparición
- Disminución del recuento de glóbulos rojos. Llame a su médico si tiene:
 - mareos
 - falta de aire
 - cansancio excesivo
- Disminución del recuento de plaquetas. Llame a su médico si tiene:



- sangrado
- nuevos hematomas
- pequeños puntos rojos en la piel
- Pérdida temporal del cabello que comienza aproximadamente 2 semanas después del primer tratamiento. Su cabello volverá a crecer.

Importante:

1. Cyclophosphamide puede reaccionar con otros medicamentos, como los anticoagulantes, digoxin (Lanoxin). Indíquelo a su médico si está tomando estos medicamentos.
2. Cyclophosphamide puede afectar su posibilidad de tener hijos (tanto a los hombres como a las mujeres), causando una esterilidad que puede ser permanente. Converse con su médico sobre métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras este bajo el tratamiento con cyclophosphamide.
3. Toda persona que toque sus medicamentos DEBE utilizar guantes desechables.
4. Usted DEBE tomar las tabletas enteras. **NO LAS PARTA NI LAS TRITURE.**