



## Carmustine (BCNU, BiCNU®)

學名:carmustine ( 卡莫司汀 )

藥品名:BCNU, BiCNU®

用途: Carmustine ( 卡莫司汀 ) 是一種化療藥物，可用來治療特定類型的癌症，這種藥物透過干擾細胞繁殖和生長，防止癌細胞生長或擴散。Carmustine ( 卡莫司汀 ) 還可以用來治療可能會擴散到腦部的癌細胞。

給藥方式:

- 由醫院或癌症治療中心受過專門訓練的護士透過靜脈(IV)給藥。

可能的副作用:

- 噁心和嘔吐。可用藥物預防或控制嘔吐。
- 透過靜脈輸注 carmustine ( 卡莫司汀 ) 的患者可能會感到:
  - 輸注部位疼痛或有燒灼感
  - 頭痛
  - 面部潮紅 ( 發紅 )

**若出現任何此類症狀，請立即告訴醫生或護士！**

- 白細胞數量減少。若出現如下症狀，請和醫生聯絡:
  - 發燒
  - 新出現咳嗽症狀
- 紅細胞數量減少。如果您感到:
  - 頭暈
  - 氣促
  - 特別累請和醫生聯絡。
- 血小板數量減少。若出現如下症狀，請和醫生聯絡:
  - 出血
  - 出現新的淤傷
  - 皮膚上有小紅點



- 治療開始約 2 週後出現暫時性脫髮。頭髮會重新長起來。
- 若發現如下情況，請告訴醫生或護士：
  - 眼白變黃
  - 尿液顏色變深
  - 膚色改變
- 肺部組織可能會出現疤痕。若出現如下症狀，請告訴醫生：
  - 乾咳
  - 氣促/呼吸困難
  - 胸痛

**請注意:**

1. Carmustine (卡莫司汀) 可能會和其他藥物產生抵觸，例如cimetidine (西米替汀) (Tagamet®)、digoxin (地高辛) (Lanoxin®)、phenytoin (苯妥英鈉) (Dilantin®)、阿斯匹林。如果您正服用這些藥物，請和您的醫生討論。
2. Carmustine (卡莫司汀) 可穿越血液和腦部間的屏障，影響大腦。「血腦屏障」通常能防止血液中的藥物進入大腦。輸注Carmustine (卡莫司汀) 時，如果您感到頭痛、面部發熱、頭暈或眩暈，請告訴護士或醫生。
3. 用Carmustine (卡莫司汀) 治療時，請和您的醫生討論避孕 (節育) 措施和/或家庭規劃服務。