



Филграстим, Г-КСФ (Neupogen®)

Непатентованное название: филграстим (filgrastim), Г-КСФ (G-CSF)

Название препарата: Neupogen®

Цель применения: Многие химиотерапевтические препараты могут снизить уровень лейкоцитов в крови. При снижении уровня лейкоцитов организму становится труднее бороться с инфекциями. Филграстим помогает организму повысить уровень лейкоцитов в крови. Филграстим не является химиотерапевтическим препаратом. Он не борется с онкологическим заболеванием.

Способ применения препарата:

- Препарат вводится внутривенно (в/в) медсестрой в больнице или онкологическом центре.
- Подкожную инъекцию (укол) препарата делает медсестра. Медсестра может обучить вас или ухаживающего за вами человека делать инъекции самостоятельно.

Возможные побочные эффекты:

- Боль или неприятные ощущения в месте инъекции (укола).
- Повышение температуры и озноб.
- Боль в костях от легкой до умеренной. В случае возникновения этих симптомов сообщите о них специалисту, оказывающему вам медицинскую помощь. Существуют препараты для борьбы с болью.
- Головная боль.

Важные указания:

1. Во время применения филграстима обсудите с врачом методы контрацепции (предотвращения беременности) и/или планирование беременности.
2. Во время применения филграстима НЕ КОРМИТЕ ребенка грудью.
3. Филграстим нельзя применять в течение 24 часов перед началом химиотерапии.
4. В кабинете врача вы будете проходить регулярную проверку числа клеток крови; вам сообщат, когда можно будет прервать лечение филграстимом.
5. Во время лучевой терапии применение филграстима может быть противопоказано. Если вы проходите лучевую терапию, то проконсультируйтесь у врача.
6. НЕ ПРИНИМАЙТЕ филграстим, если в прошлом у вас наблюдалась аллергическая реакция на филграстим или пегфилграстим.
7. Храните препарат в холодильнике. НЕ КЛАДИТЕ препарат в морозильную камеру.
8. Перед инъекцией (уколом) убедитесь, что препарат прозрачен и бесцветен.
9. НЕ ВЗБАЛТЫВАЙТЕ препарат.