



Fluorouracilo (Acrucil®)

Nombre genérico: fluorouracilo o 5-FU

Nombre del fármaco: 5-FU, Acrucil®

Para qué se utiliza: el fluorouracilo es un fármaco de quimioterapia usado para tratar determinados tipos de cáncer. Interviene en el crecimiento y la reproducción de células para evitar que el cáncer se desarrolle o extienda.

Cómo se administra el fármaco:

- Por vía intravenosa (i.v.), un enfermero especialmente capacitado lo suministra a través de una vena, en el hospital o en el Centro de Cáncer.

Posibles efectos secundarios

- Náuseas moderadas, vómitos y/o pérdida del apetito. Existen medicamentos para ayudar a prevenir o controlar las náuseas.
- Disminución de la concentración de glóbulos blancos. Comuníquese con su proveedor de atención médica si experimenta lo siguiente:
 - Fiebre
 - Tos reciente
- Disminución de la concentración de glóbulos rojos. Comuníquese con su proveedor de atención médica si se siente de la siguiente manera:
 - Mareado
 - Sin aliento
 - Muy cansado
- Disminución de la concentración plaquetas. Comuníquese con su proveedor de atención médica si experimenta lo siguiente:
 - Sangrado
 - Moretones recientes
 - Pequeñas manchas rojas en la piel
- Es posible que le aparezcan llagas en la boca dentro de los 2 a 10 días posteriores al tratamiento. Existen medicamentos para ayudarlo con cualquier molestia. Si tiene llagas en la boca:
 - use un cepillo de dientes suave
 - NO use productos que contengan alcohol, incluido el enjuague bucal
 - NO beba alcohol
 - NO coma alimentos ácidos ni picantes
- Es posible que tenga diarrea. Existen medicamentos para ayudar a prevenir o controlar la diarrea.
- Su piel estará más sensible al sol y es muy probable que se quemé. Evite el contacto directo con la luz del sol y NO use camas solares.



Use filtro solar factor 30 o superior. Use ropa que lo proteja del sol, como pantalones largos, mangas largas, sombrero y lentes de sol.

- Reacciones de la piel:
 - Oscurecimiento de la piel en las manos o en la cara
 - Oscurecimiento de las venas en el lugar de la infusión intravenosa
 - Oscurecimiento o resquebrajamiento de uñas

Importante:

1. Hable con su proveedor de atención médica acerca de métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras esté tomando fluorouracilo.
2. NO amamante mientras esté tomando fluorouracilo.
3. El fluorouracilo puede interactuar con la aspirina o medicamentos que contengan aspirina, warfarina (Coumadin[®]), tamoxifeno (Nolvadex[®]) y determinados tipos de vacunas (incluidas las inyecciones para la gripe). Hable con su proveedor de atención médica si usted está tomando esto medicamentos.