



Фторурацил (Adrucil®)

Непатентованное название: фторурацил (fluorouracil или 5-FU)

Название препарата: 5-FU, Adrucil®

Цель применения: Фторурацил является химиотерапевтическим препаратом, применяемым для борьбы с некоторыми видами злокачественных новообразований. Он воздействует на процессы воспроизведения и роста клеток, предотвращая рост или распространение опухоли.

Способ применения препарата:

- Препарат вводится внутривенно (в/в) специально обученной медсестрой в больнице или онкологическом центре.

Возможные побочные эффекты:

- Умеренная тошнота, рвота и/или потеря аппетита. Существуют препараты, позволяющие предотвратить тошноту или подавлять ее.
- Снижение уровня лейкоцитов. Обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:
 - повышение температуры;
 - появление кашля.
- Снижение уровня эритроцитов. Обратитесь к врачу, если почувствуете:
 - головокружение;
 - затруднение дыхания;
 - сильную усталость.
- Снижение уровня тромбоцитов. Обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:
 - кровотечение;
 - появление кровоподтеков;
 - появление мелких красных пятнышек на коже.
- В течение 2–10 дней после применения препарата могут появляться изъязвления в ротовой полости. Существуют препараты для борьбы с неприятными ощущениями. В случае появления изъязвлений во рту:
 - пользуйтесь мягкой зубной щеткой;
 - НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ никаких веществ, содержащих алкоголь, включая жидкость для полоскания рта;
 - НЕ ПЕЙТЕ алкоголь;
 - НЕ ЕШЬТЕ острую или кислую пищу.
- Может возникнуть диарея. Существуют препараты, позволяющие предотвратить диарею или подавлять ее.



- Кожа станет более чувствительной к солнцу, возрастет риск ожога. Избегайте прямых лучей света и НЕ ПОСЕЩАЙТЕ солярий. Пользуйтесь средствами защиты от солнечного света с SPF не менее 30. Носите одежду, способную защитить от солнца: длинные штаны, рубашки с длинными рукавами, шляпу и солнечные очки.
- Кожные реакции:
 - потемнение кожи на лице или кистях рук;
 - потемнение вен в области введения препарата;
 - потемнение или расслоение ногтей.

Важные указания

1. Во время применения фторурацила обсудите с врачом методики контрацепции (предотвращения беременности) и/или планирование беременности.
2. Во время применения фторурацила НЕ КОРМИТЕ ребенка грудью.
3. Фторурацил может взаимодействовать с аспирином или содержащими аспирин или варфарин препаратами (Coumadin[®]), тамоксифеном (Nolvadex[®]) и некоторыми видами вакцин (включая вакцины против гриппа). Если вы применяете указанные препараты, то проконсультируйтесь с врачом.