



吉西他濱 (Gemcitabine) (Gemzar®)

通用名：吉西他濱 (Gemcitabine)

藥物名稱： Gemzar®

用途： 吉西他濱 (Gemcitabine)
是一種化療藥物，用於治療若干類型的癌症。它干擾細胞繁殖及生長，以防止癌症擴展或蔓延。

給藥方式：

- 由醫院或癌症中心經過特殊培訓的護士進行靜脈 (IV) 注射。

可能的副作用：

- 可能發生輕微至中度的噁心及嘔吐。有可用藥物幫助預防或控制噁心。
- 類似流感的症狀，例如：
 - 全身疼痛
 - 發燒達 100.4°F 或更高
 - 感覺非常疲勞

有可用藥物幫助消除上述症狀。

- 輕度皮疹
- 注射部位疼痛或不適
- 白細胞計數低。如果您有下列症狀，請呼叫醫生：
 - 發燒
 - 新出現咳嗽
- 紅細胞計數低。如果您有下列症狀，請呼叫醫生：
 - 眩暈
 - 呼吸短促
 - 非常疲倦
- 血小板計數低。如果您有下列症狀，請呼叫醫生：
 - 出血
 - 新瘀傷
 - 皮膚上起微小紅斑
- 首次治療之後約 2 週，頭髮開始暫時脫落。您的頭髮會重新長出。

重要提示：

1. 使用吉西他濱 (Gemcitabine) 時，請與您的醫生討論避孕（節育）及／或家庭計劃。
2. 使用吉西他濱 (Gemcitabine) 時，請勿哺乳。
3. 您的醫務室將檢查您的血細胞計數及肝腎功能水平。