



Gemcitabina (Gemzar®)

Nombre genérico: gemcitabina

Nombre del fármaco: Gemzar®

Para qué se utiliza: la gemcitabina es un fármaco de quimioterapia usado para tratar ciertos tipos de cáncer. Interviene en el crecimiento y la reproducción de células para evitar que el cáncer se desarrolle o extienda.

Cómo se administra el fármaco:

- Por vía intravenosa (i.v.), un enfermero especialmente capacitado lo suministra a través de una vena, en el hospital o en el Centro de cáncer.

Posibles efectos secundarios:

- Es posible que tenga vómitos y náuseas de leves a moderadas. Existen medicamentos para ayudar a prevenir o controlar las náuseas.
- Síntomas parecidos a los de la gripe, como los siguientes:
 - Dolores corporales
 - Fiebre de 100,4 °F (38 °C) o superior
 - Sensación de estar muy cansado

Existen medicamentos para ayudar con estos síntomas.

- Sarpullido leve.
- Dolor o molestia en la zona de la infusión intravenosa.
- Disminución de la concentración de glóbulos blancos. Comuníquese con su médico si experimenta lo siguiente:
 - Fiebre
 - Tos reciente
- Disminución de la concentración de rojos. Llame a su médico si se siente de la siguiente manera:
 - Mareado
 - Sin aliento
 - Muy cansado
- Disminución de la concentración de plaquetas. Comuníquese con su médico si experimenta lo siguiente:
 - Sangrado
 - Moretones recientes
 - Pequeñas manchas rojas en la piel
- Pérdida temporal del cabello aproximadamente a partir de las 2 semanas posteriores al primer tratamiento. Su cabello debería crecer nuevamente.

Importante:

1. Hable con su médico acerca de métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras esté tomando gemcitabina.



2. NO amamante mientras esté tomando gemcitabina.
3. El consultorio de su médico controlará la concentración de glóbulos blancos

y los niveles de función renal y hepática.