



## Г-КСФ, пегфилграстим (Neulasta®)

Непатентованное название: Г-КСФ, пегфилграстим (G-CSF, pegfilgrastim)

Название препарата: Neulasta®

**Цель применения:** Многие химиотерапевтические препараты могут снижать уровень лейкоцитов в крови. При снижении уровня лейкоцитов организму становится труднее бороться с инфекциями. Пегфилграстим помогает организму повысить уровень лейкоцитов в крови. Пегфилграстим не является химиотерапевтическим препаратом. Он не борется с онкологическим заболеванием.

**Способ применения препарата:**

- Подкожную инъекцию (укол) препарата делает медсестра. Медсестра может обучить вас или ухаживающего за вами человека делать инъекции (уколы) самостоятельно.

**Возможные побочные эффекты:**

- Боль или неприятные ощущения в месте инъекции (укола).
- Повышение температуры и озноб.
- Легкая или умеренная боль в костях. В случае возникновения этих симптомов сообщите о них врачу. Существуют препараты для борьбы с болью.
- Головная боль.

### **Важные указания:**

1. Во время применения пегфилграстима обсудите методы контрацепции (предотвращения беременности) и/или планирование беременности со специалистом, оказывающим вам медицинскую помощь.
2. Во время применения пегфилграстима НЕ КОРМИТЕ ребенка грудью.
3. Не применяйте пегфилграстим в течение 14 дней перед началом химиотерапии.
4. В кабинете врача вы будете проходить регулярную проверку числа клеток крови.
5. НЕ ПРИНИМАЙТЕ пегфилграстим, если в прошлом у вас наблюдалась аллергическая реакция на филграстим или пегфилграстим.
6. Храните препарат в холодильнике. НЕ КЛАДИТЕ препарат в морозильную камеру.
7. Перед инъекцией (уколом) убедитесь, что препарат прозрачен и бесцветен.
8. НЕ ВЗБАЛТЫВАЙТЕ препарат.