



Rituximab (Rituxan[®])

Nombre genérico: rituximab

Nombre del fármaco: Rituxan[®]

Para qué se utiliza: el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que se utiliza para lo siguiente:

- Tratar determinados tipos de linfomas (cáncer de los ganglios linfáticos) y leucemia (cáncer de la sangre o de la médula ósea). El rituximab trabaja atacando una determinada sustancia (antígeno CD20) en las células, lo que provoca la muerte de dichas células.
- Trata diversas enfermedades autoinmunitarias, incluidas la artritis reumatoide (AR), la esclerosis múltiple (EM), la púrpura trombocitopénica idiopática o inmunitaria (PTI).
- Ayuda a disminuir el rechazo de los órganos provocado por los anticuerpos en pacientes sometidos a trasplantes.

Cómo se administra el fármaco:

- Por vía intravenosa (i.v.), un enfermero especialmente cualificado lo suministra a través de una vena, en el hospital o en el Centro de Cáncer.

Posibles efectos secundarios posibles:

- **Informe inmediatamente a su enfermero si experimenta alguno de los siguientes síntomas mientras recibe rituximab:**
 - Fiebre y escalofríos
 - Dolor de cabeza
 - Mareos o desvanecimiento
 - Debilidad
 - Sensación de tener la lengua o la garganta hinchadas
 - Reacciones de la piel:
 - Rubefacción (enrojecimiento)
 - picazón
 - ronchas
 - sarpullido
 - Dificultad para respirar o tos repentina
 - Palpitaciones del corazón o dolor torácico
 - Náuseas o vómitos
 - Dolor en el lugar del linfoma
- Síntomas parecidos a los de la gripe hasta las 24 horas después de su tratamiento, tales como:
 - dolores corporales
 - fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior
 - sensación de estar muy cansado



- síntomas del resfrío (congestión nasal, dolor de garganta, tos)
- dolor de oídos o de cabeza

Existen medicamentos para ayudar con estos síntomas.

Importante:

1. Hable con su médico acerca de métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras esté tomando rituximab.
2. NO amamante mientras esté tomando rituximab.
3. El consultorio de su médico controlará la concentración de glóbulos con regularidad.
4. Informe a su proveedor de atención médica si:
 - ha tenido reacciones al rituximab anteriormente.
 - tiene una historia médica con problemas de corazón, latido irregular del corazón o dolor torácico.
 - tiene alguna infección, incluidos resfrío, gripe, hepatitis B o C (infección activa), herpes (erupción activa), varicela o herpes (zóster), virus del Nilo Occidental.
 - ha recibido alguna vacuna (inyección) recientemente o tiene programado recibir alguna vacuna (inyección).