



## 他莫昔芬 (Tamoxifen) (Nolvadex®)

通用名： 他莫昔芬 (Tamoxifen)

藥物名稱： Nolvadex®

用途：

- 他莫昔芬 (Tamoxifen)  
是一種抗雌激素療法，被用於治療男性或尚未進入絕經期的女性的乳腺癌。乳腺癌細胞需要雌性激素方能生長。這些細胞具有依附於雌激素上的特殊受體或位置。他莫昔芬 (Tamoxifen) 將附著在這些受體上，以使癌細胞無法生長和擴散。
- 他莫昔芬 (Tamoxifen) 能降低罹患原位乳腺管癌 (DCIS) 或小葉原位癌 (LCIS) 的患者患乳腺癌的風險。

給藥方式：

- 以藥片形式口服。如果藥片由除您之外的其他人士處理，則其應戴用後即棄手套。您必須吞服整個藥片。**請勿掰碎或碾碎藥片！**

可能的副作用：

- 雌激素下降或絕經期類似症狀：
  - 熱潮紅
  - 陰道乾燥 / 瘙癢
  - 月經週期或陰道分泌物變化
  - 嚴重或異常的陰道出血
  - 體重增加
  - 液體滯留（感覺腫脹）
  - 頭痛
  - 疲乏
  - 噁心、嘔吐
  - 皮疹
  - 性慾下降
- 服用他莫昔芬 (Tamoxifen)  
的男性亦可能出現類似副作用，其中包括難以勃起或難以保持勃起。
- 若有下列情況，請告知健康護理提供者：
  - 腹痛或腹壓
  - 雙腿腫脹、疼痛或觸痛
  - 呼吸急促或呼吸困難
  - 視力模糊
- 罕見副作用包括：

- 血栓
- 中風
- 子宮內膜癌
- 白內障

**重要提示：**

1. 服用他莫昔芬 (Tamoxifen) 時，請與您的醫生討論避孕（節育）及／或家庭計劃。
2. 服用他莫昔芬 (Tamoxifen) 時，請勿哺乳。
3. 服用他莫昔芬 (Tamoxifen) 時，女性應請婦科醫生定期進行身體檢查。
4. 除您以外的接觸您的藥片的任何人必須戴用後即棄手套。
5. 您必須吞服整個藥片。**請勿掰碎或碾碎藥片！**