



Ритуксимаб (Rituxan®)

Непатентованное название: ритуксимаб (rituximab)

Название препарата: Rituxan®

Цель применения: Ритуксимаб является анти-CD20-моноклональным антителом, применяемым для:

- Лечения определенных разновидностей лимфомы (рак лимфоузлов) и лейкоза (рак крови или костного мозга). Ритуксимаб воздействует на определенное вещество (антиген CD20) на поверхности клеток, вызывая их гибель.
- Лечения различных аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит (РА), рассеянный склероз (РС), идиопатическую или иммунную тромбоцитопеническую пурпуру (ИТП).
- Снижения интенсивности отторжения пересаженных органов, вызванного антителами.

Способ применения препарата:

- Препарат вводится внутривенно (в/в) специально обученной медсестрой в больнице или онкологическом центре.

Возможные побочные эффекты:

- **Немедленно обратитесь к медсестре в случае появления следующих реакций во время введения ритуксимаба:**
 - повышение температуры и озноб;
 - головная боль;
 - головокружение или предобморочное состояние;
 - слабость;
 - ощущение, что отекает язык или горло;
 - Кожные реакции:
 - прилив крови (покраснение кожи);
 - зуд;
 - крапивница;
 - сыпь;
 - затруднение дыхания или внезапный кашель;
 - учащенное сердцебиение или боль в груди;
 - тошнота или рвота;
 - боль в области лимфомы.
- В течение 24 часов после лечения могут развиваться следующие явления:
 - ломота в теле;
 - повышение температуры до 100,4°F (38 градусов С) или выше;
 - чрезвычайная усталость;



- симптоматика простуды (насморк, боль в горле, кашель);
- боль в ухе или голове.

Существуют препараты для смягчения указанных симптомов.

Важные указания:

1. Во время применения ритуксимаба обсудите с врачом методы контрацепции (предотвращения беременности) и/или планирование беременности.
2. Во время применения ритуксимаба НЕ КОРМИТЕ ребенка грудью.
3. В кабинете врача вы будете проходить регулярную проверку числа клеток крови.
4. Сообщите врачу, если:
 - в прошлом вас были реакции на ритуксимаб;
 - у вас возникали проблемы с сердцем, нарушения ритма или боль в груди;
 - вы больны инфекционным заболеванием, включая простуду, грипп, гепатит В или С (в активной фазе), герпес (переносите активную вспышку), ветряную оспу или опоясывающий лишай, либо лихорадку западного Нила;
 - вы недавно прошли или планируете какую-либо вакцинацию (уколы).