



## 托泊替康 (Topotecan) (Hycamtin®)

通用名： 托泊替康 (Topotecan)

藥物名稱： Hycamtin®

用途： 托泊替康 (Topotecan) 是一種化療藥物，用於治療若干類型的癌症。它干擾細胞繁殖及生長，以防止癌症擴展或蔓延。

給藥方式：

- 由醫院或癌症中心經過特殊培訓的護士進行靜脈 (IV) 注射。

可能的副作用：

- 可能發生噁心、嘔吐及食慾下降。有可用藥物幫助預防或控制噁心。
- 頭痛
- 疲勞（疲倦感覺）
- 虛弱
- 腹瀉
- 便秘
- 腹（腹部）痛
- 首次治療之後約 2 週，頭髮開始暫時脫落。您的頭髮會重新長出。
- 白細胞計數低。如果您有下列症狀，請呼叫醫生：
  - 發燒
  - 新出現咳嗽
- 紅細胞計數低。如果您有下列症狀，請呼叫醫生：
  - 眩暈
  - 呼吸短促
  - 非常疲倦
- 血小板計數低。如果您有下列症狀，請呼叫醫生：
  - 出血
  - 新瘀傷
  - 皮膚上起微小紅斑

**重要提示：**

1. 使用托泊替康 (Topotecan) 時，請與您的醫生討論避孕（節育）及／或家庭計劃。
2. 使用托泊替康 (Topotecan) 時，請勿哺乳。