



Ácido zoledrónico (Zometa[®])

Nombre genérico: ácido zoledrónico

Nombre del fármaco: Zometa[®]

Para qué se utiliza: el ácido zoledrónico se utiliza para lo siguiente:

- Disminuir la posibilidad de que el cáncer de mama recurra después de que haya sido curado o esté en proceso de remisión.
- Disminuir el nivel de calcio en la sangre.
- Reducir el dolor en los huesos y disminuir el riesgo de fracturas de huesos a causa de células cancerosas que se hayan expandido hacia sus huesos.

Cómo se administra el fármaco:

- Por vía intravenosa (i.v.), un enfermero especialmente cualificado lo suministra a través de una vena, en el hospital o en el Centro de Cáncer. Cada infusión intravenosa demora 15 minutos. La frecuencia con la que usted necesitará una infusión intravenosa depende de la razón por la que usted está tomando ácido zoledrónico:
 - Para disminuir la posibilidad de que el cáncer de mama recurra, deberá tomar este medicamento dos veces al año.
 - Para disminuir la concentración de calcio en la sangre, usted deberá tomar este medicamento con líquidos intravenosos adicionales, según lo que necesite cuando su nivel de calcio sea alto.
 - Para reducir el dolor en los huesos, usted deberá tomar este medicamento una vez cada 3 ó 4 semanas.

Posibles efectos secundarios

- Síntomas leves, parecidos a los de la gripe hasta los 7 días después de su tratamiento, incluidos los siguientes:
 - dolores corporales
 - fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior
 - sensación de estar muy cansado
 - dolor en los huesos, músculos o en las articulaciones

Se dispone de medicamentos para ayudarlo con estos síntomas.

- Es posible que tenga vómitos y náuseas leves. Existen medicamentos para ayudarlo a prevenir o controlar las náuseas.
- Inflamación de encías y dolor de mandíbula
- Enrojecimiento, hinchazón y dolor en el lugar de la infusión intravenosa (i.v.).



Importante:

1. Debe realizarse análisis de sangre para comprobar la función renal antes de recibir cada dosis del ácido zoledrónico.
2. NO se someta a ninguna intervención dental que requiera anestesia local o total (incluidos los empastes, tratamientos de conductos) mientras esté tomando ácido zoledrónico. Hágase una revisión dental antes de comenzar con el tratamiento de ácido zoledrónico.
3. Hable con su médico acerca de métodos anticonceptivos (control de la natalidad) y/o planificación familiar mientras esté tomando ácido zoledrónico.
4. NO amamante mientras esté tomando ácido zoledrónico.
5. NO tome otros medicamentos para fortalecer sus huesos mientras esté tomando ácido zoledrónico. Hable con su proveedor de atención médica si usted está tomando estos medicamentos.
6. Hable con su proveedor de atención médica acerca de la posibilidad de tomar suplementos de calcio y vitamina D para aumentar los efectos del ácido zoledrónico.
7. El ácido zoledrónico puede interactuar con otros medicamentos, tales como determinados tipos de antibióticos, diuréticos, talidomida y otros fármacos que puedan afectar a los riñones. Hable con su proveedor de atención médica si usted está tomando estos medicamentos.