

Золедроновая кислота (Zometa®)

Непатентованное название: золедроновая кислота (zoledronic acid)

Название препарата: Zometa®

Цель применения: Золедроновая кислота применяется для:

- снижения риска рецидива рака молочной железы после излечения опухоли или наступления ремиссии;
- снижения уровня кальция в крови;
- уменьшения боли в костях и риска перелома костей в случае распространения опухолевых клеток в кости.

Способ применения препарата:

- Препарат вводится внутривенно (в/в) специально обученной медсестрой в больнице или онкологическом центре. Каждая инфузия препарата длится 15 минут. Частота инфузий препарата зависит от причин, по которым назначена золедроновая кислота:
 - если препарат назначен для снижения риска рецидива рака молочной железы, то вы будете получать его дважды в год;
 - если препарат назначен для снижения уровня кальция в крови, то вы будете получать его одновременно с внутривенными инфузиями жидкостей, применяемых при повышенном уровне кальция;
 - в случае применения препарата для уменьшения боли в костях его будут вводить вам один раз каждые 3–4 недели.

Возможные побочные эффекты:

- Легкие гриппоподобные симптомы в течение до 7 дней после лечения:
 - ломота в теле;
 - повышение температуры до 100,4°F (38 градусов C) или выше;
 - чрезвычайная усталость;
 - боли в костях, суставах или мышцах.

Существуют препараты для смягчения указанных симптомов.

- Может возникать легкая тошнота или рвота. Существуют препараты, позволяющие предотвращать тошноту или подавлять ее.
- Изъязвления десен и боль в челюсти.
- Покраснение, отечность и боль в месте капельного введения препарата.

**Важные указания:**

1. Перед получением каждой дозы золедроновой кислоты следует сдать анализ крови с целью проверки функции почек.
2. Во время применения золедроновой кислоты **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проходить какие-либо стоматологические процедуры, требующие применения местной или общей анестезии (включая пломбирование зубов и обработку корневых каналов). Перед началом лечения золедроновой кислотой пройдите стоматологическое обследование.
3. Во время применения золедроновой кислоты обсудите с врачом методы контрацепции (предотвращения беременности) и/или планирование беременности.
4. Во время применения золедроновой кислоты **НЕ КОРМИТЕ** ребенка грудью.
5. Во время лечения золедроновой кислотой **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ** препараты, укрепляющие кости. Если вы применяете указанные препараты, то проконсультируйтесь с врачом.
6. Обсудите со специалистом, оказывающим вам медицинскую помощь, применение пищевых добавок, содержащих кальций и витамин D, способных усилить эффект золедроновой кислоты.
7. Золедроновая кислота может взаимодействовать с другими препаратами, например, с некоторыми антибиотиками, диуретиками, талидомидом и другими препаратами, воздействующими на почки. Если вы применяете указанные препараты, то проконсультируйтесь с врачом.